

6. Wichtige Todesursachen in einigen

(Zusammenstellung des

Staaten usw.	Jahr	Einwohnerzahl in Tausend	Pocken	Malaria	Typhus	Diphtherie einschl. Krupp
Deutsches Reich ¹⁾	1905	59 768	36	4	3 750	16 967
Schweiz	1905	3 455	36	.	174	668
England und Wales	1906	34 547	21	5	3 169	6 568
Belgien	1904	7 075	656	.	1 051	1 289
Niederlande	1906	5 591	7	2	457	475
Rußland	1906	(² 64 351	32 903	2 959	(³ 15 490	46 342
Die 327 größten Orte des Deutschen Reichs	1906	20 884	1	.	1 279	4 773
Die 18 größeren städtischen Gemeinden der Schweiz ..	1906	847	4	.	57	141
Die 76 großen Städte Englands	1906	15 818	18	.	.	2 976
Die 75 Städte Dänemarks	1906	1 029	—	—	35	94
49 Städte Spaniens	1906	3 234	1 178	49	1 307	506
12 Städte Griechenlands (mit mehr als 10 000 Einw.)	1906	370	521	—	237	61
77 Städte Belgiens (nebst den 8 Vororten von Brüssel)	1906	2 686	7	.	289	302

Von je 100 000 Einwohnern starben an

Deutsches Reich ¹⁾	0,06	0,006	6,3	28,4
Schweiz	1,04	.	5,0	19,3
England und Wales	0,06	0,01	9,2	19,0
Belgien	9,3	.	14,9	18,2
Niederlande	0,1	0,04	8,2	8,5
Rußland ²⁾	51,1	4,6	24,1	72,0
Die 327 größten Orte des Deutschen Reichs	0,004	.	6,1	22,9
Die 18 größeren städtischen Gemeinden der Schweiz ..	0,5	.	6,7	16,6
Die 76 großen Städte Englands	0,1	.	.	18,8
Die 75 Städte Dänemarks	—	—	3,4	9,1
49 Städte Spaniens	36,4	1,5	40,4	15,3
12 Städte Griechenlands (mit mehr als 10 000 Einwohnern) ..	140,8	—	64,1	16,5
77 Städte Belgiens (nebst den 8 Vororten von Brüssel) ..	0,3	.	10,8	11,2

¹⁾ Ausschl. Mecklenburg-Schwerin, Mecklenburg-Strelitz und Neuß j. V. — ²⁾ Bevölkerung des Russischen auf durchschnittlich 64 351 083, d. i. 49,5 Prozent der Bevölkerung. — ³⁾ Außerdem starben 32 529 Ein tuberculosis und phthisis (not otherwise defined). — ⁴⁾ Krankheiten der Atmungsorgane ausschl. Diphtherie entzündung. — ⁵⁾ Enteritis der kleinen Kinder. — ⁶⁾ Epidemic diarrhoea, diarrhoea, gastric catarrh, gastro-
¹¹⁾ Cholera nostras, gastro-enteritis (bei Kindern unter 2 Jahren), dysenteria. — ¹²⁾ Entérite (des
akuter Darmkatarrh. — ¹³⁾ Cholera nostras, diarréa y enter., diarréa en menores de dos años, catarrhe dysentérique (colite). — ¹⁴⁾ Cholera nostras, diarrhée et entérite (au-dessous de 2 ans),