

5. Wichtige Todesursachen in einigen

(Zusammenstellung des

Staaten usw.	Jahr	Ein- wohner- zahl in Tausend	Pocken	Flecken- fieber	Typhus	Diph- therie einschl. Krupp
Deutsches Reich ¹⁾	1908	62 112	62	3	2 929	14 909
Schweiz	1908	3 555	2	.	135	565
England und Wales	1909	35 757	21	15	2 142	5 235
Belgien	1908	7 386	42	.	824	1 228
Niederlande	1909	5 857	1	—	324	457
Rußland	1909	(⁸ 64 827	40 642	8 074	(⁹ 20 348	58 109
Die 349 größten Orte des Deutschen Reichs	1909	22 890	3	.	1 135	5 487
18 große städtische Gemeinden der Schweiz	1909	887	3	.	39	138
72 Städte Frankreichs (mit 30 000 und mehr Einwohnern) ¹⁰⁾	1908	8 269	46	3	1 643	836
76 große Städte Englands	1909	16 445	14	.	.	2 409
75 Städte Dänemarks	1909	1 078	3	—	45	99
49 Städte Spaniens	1909	3 330	1 398	636	1 502	827
74 Städte Belgiens (nebst den 12 Vororten von Brüssel)	1909	2 823	4	.	197	268
32 Städte Rumäniens	1909	996	1	3	800	167

Von je 100 000 Einwohnern starben an

Deutsches Reich ¹⁾	0,1	0,005	4,7	24,0
Schweiz	0,06	.	3,8	15,9
England und Wales	0,06	0,04	6,0	14,6
Belgien	0,6	.	11,2	16,6
Niederlande	0,02	—	5,5	7,8
Rußland	62,7	12,5	31,4	89,6
Die 349 größten Orte des Deutschen Reichs	0,01	.	5,0	24,0
18 große städtische Gemeinden der Schweiz	0,3	.	4,4	15,6
72 Städte Frankreichs (mit 30 000 und mehr Einwohnern)	0,6	0,04	19,9	10,1
76 große Städte Englands	0,09	.	.	14,6
75 Städte Dänemarks	0,3	—	4,2	9,2
49 Städte Spaniens	42,0	19,1	45,1	24,8
74 Städte Belgiens (nebst den 12 Vororten von Brüssel)	0,1	.	7,0	9,5
32 Städte Rumäniens	0,1	0,3	80,3	16,8

¹⁾ Ausschließlich Mecklenburg-Schwerin und Mecklenburg-Strelitz. — ²⁾ Krebs und andere Neubildungen. —
 wise defined). — ⁵⁾ Infective enteritis, epidemic diarrhoea, diarrhoea (not otherwise defined), gastritis,
⁷⁾ Cholera nostras, affections de l'estomac (cancer excepté), diarrhée et entérite (au-dessous de
 d. i. etwa 48,9 v. S. der Gesamtbevölkerung des Russischen Reichs von 132 650 000. — ⁹⁾ Außerdem starben
¹⁰⁾ Darmkatarrh der Kinder; außerdem 11 338 Fälle von Ruhr. — ¹¹⁾ Krankheiten der Atmungsorgane einschli.
¹²⁾ Enteritis im 1. Lebensjahre. — ¹⁴⁾ Diarrhoea. — ¹⁵⁾ Brechdurchfall und akuter Darmkatarrh. —
 (menos cancer). — ¹⁷⁾ Gastro-entérite, diarrhées et entéritis (sous deux ans), affections de l'estomac