

europäischen Staaten und Städtegruppen

ursachen

In- fluenza	Tuberkulose			Typhus	Schlaf- sucht- krank- heit	Genick- starre	Kind- bett- fieber	Asia- tische Cholera	Cholera nostras, ein- heimi- scher Brech- durchfall	Wechsel- fieber	Rose und andere über- tragbare Krank- heiten ¹⁾	darunter		
	der Lun- gen und akute Miliar- tuber- kulose	anderer Organe	über- haupt									Rose	Ruhr	Lepra
0,8	12,4	1,8	14,3	0,9	.	0,04	16,6	0,01	.	0,003	0,4	0,3	0,1	0,0003
0,9	13,0	1,8	14,8	1,1	.	0,2	19,1	0,3	.	0,003	0,8	0,4	0,4	0,0002
1,0	14,1	2,1	16,2	0,4	.	0,1	22,0	0,01	.	0,02	0,8	0,4	0,4	0,0002
1,1	18,2	2,4	20,6	0,8	.	0,1	22,3	0,01	.	0,04	3,1	0,4	2,7	0,0002
29,3	20,5	2,5	23,0	0,8	.	0,1	25,8	0,01	.	0,1	1,6	0,4	1,2	0,0005
6,8	18,4	2,7	21,1	0,6	.	0,1	27,9	0,0003	.	0,02	1,3	0,4	0,9	0,0005
9,6	18,2	2,2	15,4	0,5	.	0,1	28,3	—	.	0,01	1,2	0,4	0,8	—
2,7	11,7	1,9	13,6	0,4	.	0,1	27,2	0,0003	.	0,01	1,2	0,3	0,9	0,0002
6,4	12,3	1,9	14,2	0,3	.	0,1	24,0	—	.	0,01	0,5	0,3	0,1	0,0002
3,9	13,0	2,1	15,1	0,3	.	0,1	28,8	—	.	0,01	0,5	0,3	0,2	0,0002
10,1	14,3	3,7	18,0	2,7	.	.	31,9	—	0,1	0,9	1,0	.	.	.
8,6	14,4	3,6	18,0	3,4	.	.	30,2	—	0,1	1,0	1,1	.	.	.
1,8	19,4	3,9	23,3	2,6	.	.	26,2	0,01	0,1	0,1	0,5	.	.	.
1,5	18,2	3,7	21,9	1,9	.	.	31,6	0,02	0,1	0,1	0,5	.	.	.
1,5	17,9	3,6	21,5	0,9	.	.	29,5	0,02	0,1	0,1	0,6	.	.	.
1,5	18,3	3,8	22,1	0,8	.	.	29,4	0,03	0,1	0,1	0,5	.	.	.
27,9	18,2	3,5	21,7	0,7	.	.	26,9	0,1	0,2	0,1	0,9	.	.	.
10,9	17,0	3,6	20,6	0,6	.	.	28,6	0,1	0,1	0,1	0,6	.	.	.
3,9	8,8	2,6	11,4	0,6	.	.	25,0	—	0,1	0,1	0,6	.	.	.
3,0	8,7	2,4	11,1	0,6	.	.	23,0	—	0,03	0,1	0,8	.	.	.
4,6	8,8	2,4	11,2	0,5	.	.	20,5	—	0,02	0,1	0,5	.	.	.
5,2	8,6	2,8	11,4	0,2	0,1	0,1	7,0	—	0,004	0,01	0,3	0,2	0,01	0,004
4,6	7,6	1,9	9,5	0,1	0,1	0,2	9,2	—	2,1	0,01	0,8	0,3	—	.
47,1	14,9	2,6	17,6	0,7	.	0,1	12,4	0,01	0,1	0,002	0,5	0,4	0,04	0,01
27,9	16,2	3,4	19,6	0,4	.	0,1	8,0	.	1,5	0,01	0,5	0,3	0,1	0,05
6,7	15,5	3,9	19,4	0,4	.	0,1	13,2	.	1,3	0,01	0,6	0,4	0,1	0,1
5,6	9,0	2,2	11,2	0,1	0,1	0,1	*) 13,8	—	0,0003	0,03	0,3	0,2	0,1	—
0,7	10,7	5,3	16,0	0,3	.	0,5	*) 16,8	.	.	0,01	0,4	0,2	0,02	.
0,6	10,5	5,3	15,9	0,2	.	0,3	*) 16,9	.	.	0,02	0,4	0,2	0,03	.
3,9	10,8	5,2	16,0	0,3	.	0,3	*) 11,5	.	.	0,03	0,3	0,2	0,02	.
2,6	8,9	4,2	13,1	0,2	.	0,3	*) 14,1	.	.	0,1	0,4	0,3	0,1	.
0,6	8,6	3,8	12,4	0,2	.	0,2	*) 17,7	.	.	0,1	0,5	0,3	0,04	.
2,7	8,1	3,6	11,8	0,2	0,1	0,2	*) 20,3	.	.	0,04	0,6	0,4	0,05	.
7,6	8,3	3,6	11,9	0,1	0,1	0,2	*) 19,8	.	.	0,01	0,5	0,4	0,02	.
2,3	16,9	4,6	.	0,6	.	0,1	*) 18,6	—	0,01	0,01	0,2	.	0,05	.
3,3	17,6	4,6	.	0,6	.	0,1	*) 15,1	—	0,01	0,02	0,2	.	0,04	.
24,3	17,3	4,6	.	0,6	.	0,2	*) 15,9	—	0,03	0,01	0,2	.	0,03	.
21,1	18,0	4,4	.	0,4	.	0,1	*) 15,1	—	0,01	0,02	0,2	.	0,09	.
2,8	.	.	.	0,6	0,1	0,1	.	—	.	.	.	.	0,04	.
2,1	13,0	2,7	.	0,4	0,1	0,1	*) 17,0	—	.	0,02	0,4	0,1	0,06	.
3,8	.	.	16,7	0,3	.	0,2	40,0	.	.	.	.	.	0,2	.
2,2	.	.	17,8	0,3	.	0,2	47,8	.	.	.	.	.	0,3	.
6,2	24,7	5,6	30,3	4,2	.	.	.	—	0,03	0,4	0,8	.	.	.
4,1	8,3	1,8	10,1	0,1	0,1	0,2	12,0	—	1,9	—	0,6	0,3	—	.
0,8	12,9	3,2	16,1	0,3	.	.	.	—	0,1	—	0,7	0,3	0,01	—
3,8	13,2	3,1	16,2	0,3	.	.	.	—	0,05	0,01	0,5	0,3	—	—
30,0	17,1	3,8	20,8	0,6	.	0,2	7,7	.	2,4	—	0,7	0,5	0,1	0,1
8,5	16,3	4,2	20,5	0,6	.	0,1	15,2	.	1,6	—	0,9	0,6	0,1	0,1

Pest, Gelbfieber, Paratyphus und Mumps. — *) Die Sterbefälle an Folgen der Geburt und der Schwangerschaft und an Kindbettfieber