

81. Gewinnung von Ammoniumsulfat (In 1 000 metrischen Tonnen)

Jahre	Deutsches Reich (ohne Saarland)		Saar- land ⁴⁾	Belgien		Frankreich			Groß- britan- nien ⁶⁾	Italien		Nieder- lande	Öster- reich
	Ins- gesamt	davon aus Kokereien ¹⁾		Ins- gesamt	davon aus Kokereien	Ins- gesamt	davon aus Kokereien	Gaswerken		Ins- gesamt	davon aus Kokereien		
1930	.	455,5	29,2	167,0	72,6	363,0	112,6	27,1	789,6	141,0	9,8	140,1	6,0
1931	.	335,5	22,5	239,3	69,2	318,0	99,3	27,4	657,0	138,4	9,6	371,8	6,4
1932	.	285,7	19,4	255,0	60,9	390,0	73,4	23,0	777,7	124,7	8,8	378,5	6,4
1933	2) 873,2	297,6	20,8	258,7	60,9	3) 351,0	83,0	20,7	698,5	104,5	9,7	349,6	6,5
1934	.	347,6	22,1	248,0	58,4	3) 298,0	90,8	18,4	614,9	134,6	10,6	250,0	6,2
1935	2) 3) 890,2	3) 412,1	.	246,0	78,2	3) 246,0	88,2	16,8	627,1	122,0	12,0	262,2	6,1
1936	2) 3) 946,2	3) 478,8	.	200,0	.	.	.	.	148,0	13,4	245,1	.	.

Jahre	Polen	Schweden	Spanien	Tschechoslowakei		Japan ⁸⁾	Canada	Vereinigte Staaten von Amerika ⁹⁾			Austral. Bund
				Ins- gesamt	davon aus Kokereien			Ammonium- sulfat	Ammoniak- wasser ¹⁰⁾	Ins- gesamt ¹¹⁾	
1930	73,7	18,8	18,2	81,0	35,7	265,8	21,7	608,7	22,2	697,6	9,0
1931	57,4	10,2	19,0	44,8	29,0	393,2	25,7	446,2	17,7	517,1	11,2
1932	54,3	10,0	11,6	28,0	17,5	684,9	52,4	260,9	15,5	323,1	12,5
1933	57,2	7) 4,7	12,2	32,0	17,3	712,7	74,9	307,8	18,4	381,3	12,8
1934	58,6	7) 4,6	18,8	37,3	20,4	802,7	69,2	356,3	19,8	435,4	17,4
1935	60,6	7) 4,5	17,2	.	22,7	861,2	61,0	418,9	18,9	494,7	19,5
1936	59,3	.	.	.	.	1 270,0	90,0	544,1	21,4	629,9	.

¹⁾ Ammoniumsulfat und andere Ammoniakverbindungen. — ²⁾ Ohne die in Mischdüngern enthaltenen Mengen. — ³⁾ Seit März 1935 einschl. Saarland. — ⁴⁾ Nur aus Kokereien. — ⁵⁾ Wirtschaftsjahr, endend 30. Juni des folgenden Jahres. — ⁶⁾ Ammoniumsulfat-Äquivalent aller Ammoniakverbindungen und von Ammoniakwasser. — ⁷⁾ Aus Kokereien und Gaswerken. — ⁸⁾ Seit 1932 einschl. Korea. — ⁹⁾ Aus Nebenproduktanlagen von Kokereien und einigen öffentlichen Gaswerken. — ¹⁰⁾ Ammoniak-Äquivalent. — ¹¹⁾ Ammoniumsulfat-Äquivalent.

82. Gewinnung von Stickstoffverbindungen *)

(In 1 000 metrischen Tonnen Rein-Stickstoff)

Länder	1932				1933				1934				1935			
	Insge- samt	davon			Insge- samt	davon			Insge- samt	davon			Insge- samt	davon		
		Ammo- niak	Sal- peter- Stickstoff	Calcium- cyanamid		Ammo- niak	Sal- peter- Stickstoff	Calcium- cyanamid		Ammo- niak	Sal- peter- Stickstoff	Calcium- cyanamid		Ammo- niak	Sal- peter- Stickstoff	Calcium- cyanamid
Welt.....	1496,9	.	.	.	1614,9	.	.	.	1799,7	.	.	.	2003,6	.	.	.
davon:																
Deutsches Reich ¹⁾	448,9 ²⁾	190,6 ²⁾	186,5	71,8	452,3 ²⁾	196,2 ²⁾	171,5	84,6	513,5 ²⁾	198,9 ²⁾	208,8	105,8	588,5 ²⁾	219,7 ²⁾	240,3	128,5
Saarland	3,9	3,9	—	—	4,2	4,2	—	—	4,6	4,6	—	—	.	.	.	.
Belgien	57,7	51,0	4,5	2,2	59,0	51,7	4,9	2,4	57,1	49,6	4,9	2,6	70,0	61,0 ⁶⁾	4,9	4,1
Frankreich	122,4	76,1	37,2	9,1	136,5	72,8	55,4	8,3	128,1	65,8	56,0	6,3	116,1	53,0	56,4	6,7
Großbritannien ...	164,9	.	.	.	148,1	.	.	.	130,4	.	.	.	132,9	.	.	.
Italien	58,3	29,2	12,7	16,4	71,3	25,2	18,7	27,4	83,9	30,7	26,2	27,0	.	.	.	.
Jugoslawien	6,1	—	—	6,1	5,0	—	—	5,0	4,7	—	—	4,7	4,6	—	—	4,6
Niederlande	75,7	75,7	—	—	69,9	69,9	—	—	50,0	50,0	—	—	53,9	53,9	—	—
Norwegen	62,3	0,1	56,9	5,3	80,2	—	76,2	4,0	64,8	0,1	58,4	6,3	75,2	1,3	66,9	7,0
Polen	31,4	15,3	13,9	2,2	27,2	14,2	11,0	2,0	31,4	15,2	9,7	6,5	31,7	12,7	12,7	6,3
Rußland (UdSSR) ..	9,9	9,9	—	—	27,7	27,7	—	—	53,2	53,2	—	—	.	.	.	.
Schweden	6,6	.	.	.	7,1	.	.	.	6,3	.	.	.	7,3	.	.	.
Schweiz	0,6	0,2	—	0,4	2,7	0,2	—	2,5	1,8	0,3	—	1,5	1,2	0,4	—	0,8
Tschechoslowakei ³⁾	14,9	6,7	3,9	4,3	15,0	7,3	3,9	3,8	19,0	8,9	5,7	4,4 ⁶⁾	22,0 ⁶⁾	16,7 ⁶⁾	5,3 ⁷⁾	.
Japan ⁴⁾	110,6	91,9	—	18,7	124,6	94,3	—	30,3	125,4	98,8	—	26,6	162,3	122,4	—	39,9
Korea	44,1	44,1	—	—	49,4	49,4	—	—	62,1	62,1	—	—	69,9	69,9	—	—
Canada	27,7	12,1	—	15,6	23,7	15,6	—	8,1	32,5	15,3	—	17,2	34,9	15,5	—	19,4
Vereinigte Staaten von Amerika...	163,0	.	.	.	209,5	.	.	.	232,9	.	.	.	263,1	.	.	.
Chile ⁵⁾	69,8	—	69,8	—	83,1	—	83,1	—	175,6	—	175,6	—	189,1	—	189,1	—
Übrige ⁶⁾	18,1	16,1	2,0	—	18,4	16,6	1,8	—	22,4	19,3	3,0	0,1	43,8	39,1	4,6	0,1

*) Ammoniumnitrat, Natriumnitrit, Nitrophoska sind unter Salpeterstickstoff gerechnet; Harnstoff, Ammoniumsulfatnitrat u. dgl. Mischungen unter Ammoniakstickstoff. — ¹⁾ Nichtamtlich; bis 1934 ohne Saarland. — ²⁾ Nach Angaben des Stickstoffsyndikates, G m b H, Berlin; Abladungen der Fabriken. — ³⁾ Jahre beginnend 1. Mai. — ⁴⁾ Ohne die auf Ammoniumsulfat weiterverarbeiteten Mengen von Cyanamidstickstoff. — ⁵⁾ Jahre beginnend am 1. Juli. — ⁶⁾ Z. T. geschätzt. — ⁷⁾ Bei Ammoniakstickstoff.

83. Gewinnung von Aluminium *)

(In 1 000 metrischen Tonnen)

Jahre	Deutsches Reich	Frank- reich	Groß- britannien	Italien	Nor- wegen	Österreich	Rußland (UdSSR)	Schweden	Schweiz	Spanien	Canada	V. Staaten v. Am.		Welt ¹⁾
												primär	sekundär	
1930	30,7	24,6	13,2	8,0	27,4	3,0	—	—	20,5	1,1	32,5	103,9	35,0	269,7
1931	27,1	18,2	14,2	11,1	21,4	2,5	—	—	12,2	1,0	28,4	80,5	27,5	219,5
1932	19,2	14,4	10,2	13,4	17,8	2,1	0,9	—	8,5	1,2	17,8	47,6	21,8	163,7
1933	18,3	14,3	11,0	12,1	15,4	2,1	4,4	—	7,5	1,2	16,2	38,6	30,4	148,0
1934	37,2	15,1	12,9	12,8	15,3	2,1	14,4	0,3	8,2	1,2	15,7	33,6	42,1	170,8
1935	70,8	22,0	15,1	13,8	15,0	2,5	24,6	1,8	11,7	1,3	21,4	54,1	46,6	289,2
1936	97,2	26,5	16,6	16,2	16,4	3,0	37,9	1,8	13,4	0,7	28,9	102,0	46,6	366,5

*) Angaben in Kursivdruck vorwiegend nach: Statistische Zusammenstellungen der Metallgesellschaft A. G., Frankfurt a. M. — ¹⁾ Einschließlich der hier nicht besonders aufgeführten Länder. Nur primäres Aluminium.