

1. Neuerkrankungen an melde

Lfd. Nr.	Land	Diphtherie	Scharlach	Keuchhusten	Masern	Übertragbare			Unterleibstypus	Paratyphus	Ruhr
						Genickstarre	Gehirnentzündung	Kinderlähmung			
											Grund
1	Schleswig-Holstein	1 280	2 738	3 755	1 151	43	8	54	495	429	42
2	Hamburg	559	2 386	2 904	.	28	5	26	95	100	53
3	Niedersachsen	3 390	10 228	6 357	.	122	28	66	594	1 214	128
4	Bremen	206	807	599	.	14	1	3	24	98	106
5	Nordrhein-Westfalen	12 215	18 663	11 641	2 791	207	33	147	1 446	1 609	213
6	Hessen	1 774	6 823	4 488	8 410	122	28	58	250	217	101
7	Rheinland-Pfalz	1 954	3 312	2 601	2 809	81	38	48	242	259	14
8	Baden-Württemberg	1 687	8 275	6 603	9 601	140	44	151	352	798	127
9	Bayern	4 091	11 891	10 710	31 914	158	32	716	588	390	241
10	Bundesgebiet 1951⁵⁾	27 156	65 123	49 658	56 676	915	217	1 269	4 086	5 114	1 025
11	vorläufiges Ergebnis 1952	20 842	50 471	43 860	16 846	911	197	9 517	3 355	3 790	1 299
12	dagegen 1950	40 584	86 924	57 242	35 981	759	216	2 830	5 472	5 428	1 007
13	1949	47 885	59 440	54 607	19 484	921	188	1 733	8 357	5 881	962
14	1948	60 018	38 421	65 839	28 815	1 037	294	5 404	12 152	6 125	1 600
15	1947	91 718	22 704	40 155	42 618	1 238	332	3 296	19 827	12 361	4 141
16	1946 ⁶⁾	142 788	23 754	.	.	989	269	947	22 406 ⁷⁾	6 102 ⁷⁾	3 244
17	West-Berlin	920	6 106	.	.	30	2	115	144	141	480
18	dagegen 1950	1 916	7 759	.	.	24	3	49	198	135	276
19	1949	2 165	1 547	.	.	37	2	419	249	62	318
20	1948	2 598	659	.	.	33	2	422	429	71	476
											Verhältniszahlen auf 10 000
21	Schleswig-Holstein	5,06	10,83	14,85	4,55	0,17	0,03	0,21	1,96	1,70	0,17
22	Hamburg	3,41	14,55	17,71	.	0,17	0,03	0,16	0,58	0,61	0,32
23	Niedersachsen	5,03	15,17	9,43	.	0,18	0,04	0,10	0,88	1,80	0,19
24	Bremen	3,59	14,06	10,44	.	0,24	0,02	0,05	0,42	1,71	1,85
25	Nordrhein-Westfalen	9,09	13,89	8,66	2,08	0,15	0,02	0,11	1,08	1,20	0,16
26	Hessen	4,06	15,61	10,27	19,24	0,28	0,06	0,13	0,57	0,50	0,23
27	Rheinland-Pfalz	6,34	10,75	8,44	9,12	0,26	0,12	0,16	0,79	0,84	0,05
28	Baden-Württemberg	2,58	12,65	10,09	14,67	0,21	0,07	0,23	0,54	1,22	0,19
29	Bayern	4,45	12,92	11,64	34,68	0,17	0,03	0,78	0,64	0,42	0,26
30	Bundesgebiet 1951⁵⁾	5,64	13,53	10,32	14,47	0,19	0,05	0,26	0,85	1,06	0,21
31	vorläufiges Ergebnis 1952	4,30	10,41	9,05	6,52	0,19	0,04	1,96	0,69	0,78	0,27
32	dagegen 1950	8,51	18,23	12,01	7,55	0,16	0,05	0,59	1,15	1,14	0,21
33	1949	10,16	12,61	11,59	4,14	0,20	0,04	0,37	1,77	1,25	0,20
34	1948	12,95	8,29	14,20	6,22	0,22	0,06	1,17	2,62	1,32	0,35
35	1947	20,25	5,01	8,87	9,41	0,27	0,07	0,73	4,38	2,73	0,91
36	1946 ⁶⁾	33,03	5,49	.	.	0,23	0,06	0,22	5,18 ⁷⁾	1,45 ⁷⁾	0,75
37	West-Berlin	4,25	28,23	.	.	0,14	0,01	0,53	0,67	0,65	2,22
38	dagegen 1950	8,96	36,30	.	.	0,11	0,01	0,23	0,93	0,63	1,29
39	1949	10,29	7,35	.	.	0,18	0,01	1,99	1,18	0,29	1,51
40	1948	12,36	3,13	.	.	0,16	0,01	2,01	2,04	0,34	2,26

* Bundesgebiet und West-Berlin. — ¹⁾ Bezogen auf die weibliche Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 45 Jahren. — ²⁾ In den Jahren

⁴⁾ Ohne Reg.-Bez. Südwürttemberg-Hohenzollern. — ⁵⁾ Ohne die Länder, von denen für einzelne Krankheiten keine Meldungen

⁶⁾ Soweit für einzelne Krankheiten von einigen Ländern keine Meldungen vorliegen, ist bei der Bevölkerung, auf die die Erkrankungs-