

III. Gesund

1. Neuerkrankungen an den wichtigsten

Lfd. Nr.	Land	Diphtherie	Scharlach	Keuchhusten	Übertragbare			Unterleibstypus
					Genickstarre	Gehirnentzündung	Kinderlähmung	
Grund Bundesgebiet								
1	1946 ¹⁾	142 788	23 754	.	989	269	947	22 406 ⁶⁾
2	1947	91 718	22 704	40 155	1 238	332	3 296	19 827
3	1948	60 018	38 421	65 839	1 037	284	5 404	12 152
4	1949	47 885	59 440	54 607	921	188	1 733	8 357
5	1950	40 584	86 924	57 242	759	216	2 830	5 472
6	1951	27 156	65 123	49 658	915	217	1 269	4 086
7	1952	20 842	50 471	43 860	911	197	9 517	3 355
8	1953	18 342	70 841	60 521	919	228	2 243	3 628
1952 nach								
9	Schleswig-Holstein	740	2 372	2 247	22	9	382	378
10	Hamburg	385	2 370	1 968	20	4	148	60
11	Niedersachsen	2 440	7 185	5 921	119	22	1 630	553
12	Bremen	128	546	888	21	—	184	19
13	Nordrhein-Westfalen	9 521	13 951	7 955	222	34	4 419	1 104
14	Hessen	1 422	4 731	4 673	143	17	696	215
15	Rheinland-Pfalz	1 985	2 650	2 255	88	53	642	227
16	Baden-Württemberg	1 101	6 712	7 719	113	30	549	346
17	Bayern	3 120	9 954	10 234	163	28	867	453
1953 nach								
18	Schleswig-Holstein	607	3 139	4 146	32	7	452	290
19	Hamburg	249	3 104	2 597	14	9	60	54
20	Niedersachsen	2 033	9 156	5 067	93	24	294	435
21	Bremen	109	1 192	907	8	—	21	47
22	Nordrhein-Westfalen	8 759	19 964	9 503	277	36	230	971
23	Hessen	1 095	6 564	8 059	135	18	99	303
24	Rheinland-Pfalz	1 996	3 426	3 751	78	50	73	167
25	Baden-Württemberg	914	8 561	10 188	84	35	400	940
26	Bayern	2 580	15 735	16 303	198	49	614	421
West-Berlin								
27	1950	1 916	7 759	.	24	3	49	198
28	1951	920	6 106	.	30	2	115	144
29	1952	580	3 315	.	41	5	211	130
30	1953	417	4 822	2 669	37	3	86	108
Verhältniszahlen auf Bundesgebiet								
31	1946 ¹⁾	33,03	5,49	.	0,23	0,06	0,22	5,18 ⁸⁾
32	1947	20,25	5,01	8,87	0,27	0,07	0,73	4,38
33	1948	12,95	8,29	14,20	0,22	0,06	1,17	2,62
34	1949	10,16	12,61	11,59	0,20	0,04	0,37	1,77
35	1950	8,51	18,23	12,01	0,16	0,05	0,59	1,15
36	1951	5,64	13,53	10,32	0,19	0,05	0,26	0,85
37	1952	4,30	10,41	9,05	0,19	0,04	1,96	0,69
38	1953 ²⁾	3,74	14,46	12,35	0,19	0,05	0,46	0,74
1952 nach								
39	Schleswig-Holstein	3,01	9,65	9,14	0,09	0,04	1,55	1,54
40	Hamburg	2,30	14,19	11,78	0,12	0,02	0,89	0,36
41	Niedersachsen	3,65	10,76	8,87	0,18	0,03	2,44	0,83
42	Bremen	2,18	9,30	15,13	0,36	—	3,14	0,32
43	Nordrhein-Westfalen	6,94	10,16	5,79	0,16	0,02	3,22	0,80
44	Hessen	3,22	10,73	10,59	0,32	0,04	1,58	0,49
45	Rheinland-Pfalz	6,32	8,44	7,18	0,28	0,17	2,04	0,72
46	Baden-Württemberg	1,66	10,11	11,63	0,17	0,05	0,83	0,52
47	Bayern	3,40	10,85	11,16	0,18	0,03	0,95	0,49
1953 nach								
48	Schleswig-Holstein	2,55	13,16	17,39	0,13	0,03	1,90	1,22
49	Hamburg	1,46	18,20	15,23	0,08	0,05	0,35	0,32
50	Niedersachsen	3,07	13,82	7,65	0,14	0,04	0,44	0,66
51	Bremen	1,81	19,83	15,09	0,13	—	0,35	0,78
52	Nordrhein-Westfalen	6,22	14,18	6,75	0,20	0,03	0,16	0,69
53	Hessen	2,46	14,74	18,09	0,30	0,04	0,22	0,68
54	Rheinland-Pfalz	6,24	10,70	11,72	0,24	0,16	0,23	0,52
55	Baden-Württemberg	1,35	12,64	15,05	0,12	0,05	0,59	1,39
56	Bayern	2,81	17,15	17,77	0,22	0,05	0,67	0,46
West-Berlin								
57	1950	8,96	36,30	.	0,11	0,01	0,23	0,93
58	1951	4,25	28,23	.	0,14	0,01	0,53	0,67
59	1952	2,67	15,28	.	0,19	0,02	0,97	0,60
60	1953	1,87	21,64	11,98	0,17	0,01	0,39	0,48

¹⁾ Bezogen auf die weibliche Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 45 Jahren. — ²⁾ In den Jahren 1947 bis 1949 einschl. Rückfälle, verdächtige Tiere. — ³⁾ Ohne Lindau. — ⁴⁾ Paratyphuserkrankungen im Reg.-Bez. Süd-Baden in der Position »Unterleibstypus« erkrankungszahlen bezogen sind, die Einwohnerzahl der betreffenden Länder abgesetzt. — ⁵⁾ Vorläufige Ergebnisse.