

4. Sterbefälle im Jahre 1957 nach Todes

b) Gestorbene auf

| Nr. der intern. Liste B | Todesursache () Nr. des deutschen Todesursachenverzeichnisses 1950 | Gestorbene insgesamt | Gestorbene männliche | | | | |
|-------------------------|--|----------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------|-------|
| | | | insgesamt | davon im Alter von ... bis | | | |
| | | | | ¹⁾ unter 7 Tagen | 7 Tage ¹⁾ bis unter 1 Jahr | 1—5 | 5—15 |
| B 1 | Tuberkulose der Atmungsorgane (00, 01)..... | 17,1 | 26,0 | 2,5 | 0,6 | 0,1 | 1,7 |
| B 2 | Andere Formen der Tuberkulose (02, 03) | 1,7 | 1,8 | 1,4 | 2,3 | 0,6 | 0,7 |
| B 3 | Syphilis und Folgeerscheinungen (05) | 1,6 | 2,0 | 4,5 | 0,1 | 0,1 | 0,02 |
| B 4 | Typhus (071) | 0,1 | 0,1 | — | 0,1 | 0,03 | 0,2 |
| B 5 | Cholera (081) | — | — | — | — | — | — |
| B 6 | Alle Arten von Dysenterie (083) | 0,03 | 0,04 | — | — | 0,1 | 0,02 |
| B 7 | Scharlach und durch Streptokokken verursachte Rachenkrankheiten (09, 137) | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 0,1 |
| B 8 | Diphtherie (11) | 0,2 | 0,2 | 0,9 | 0,8 | 0,4 | 0,02 |
| B 9 | Keuchhusten (132) | 0,6 | 0,7 | 25,6 | 2,3 | 0,2 | — |
| B 10 | Meningokokken-Infektionen (12) | 0,3 | 0,4 | 6,6 | 2,3 | 0,1 | 0,1 |
| B 11 | Pest (133) | — | — | — | — | — | — |
| B 12 | Akute übertragbare Kinderlähmung (151) | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 1,1 | 0,7 | 1,1 |
| B 13 | Pocken (161) | — | — | — | — | — | — |
| B 14 | Masern (162) | 0,3 | 0,3 | 4,8 | 2,2 | 0,3 | 0,05 |
| B 15 | Fleckfieber und andere Rickettsien-Erkrankungen (17) | 0,00 | 0,00 | — | — | — | — |
| B 16 | Malaria (18) | 0,02 | 0,03 | — | — | — | 0,02 |
| B 17 | Alle sonstigen infektiösen oder parasitären Erkrankungen (06, 072, 073, 082, 084, 10, 131, 134—136, 139, 14, 152—154, 163—167, 169, 19) | 2,8 | 3,0 | 16,5 | 3,7 | 1,4 | 1,0 |
| B 18 | Bösartige Neubildungen einschl. der Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe (20—25) | 202,3 | 212,7 | 6,3 | 10,3 | 6,8 | 10,2 |
| B 19 | Gutartige und nicht näher bezeichnete Neubildungen (26, 27) | 9,6 | 9,3 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,3 |
| B 20 | Diabetes mellitus (33) | 11,9 | 8,3 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,6 |
| B 21 | Anämien (861, 865) | 2,5 | 2,1 | — | 0,7 | 0,1 | 0,4 |
| B 22 | Gefäßschädigungen des Zentralnervensystems (37) .. | 175,7 | 165,2 | 1,6 | 0,5 | 0,3 | 1,1 |
| B 23 | Hirnhautentzündung, nicht durch Meningokokken verursacht (381) | 1,5 | 1,9 | 28,5 | 3,8 | 0,7 | 0,9 |
| B 24 | Fieberhafte rheumatische Erkrankungen (40, 41) .. | 0,6 | 0,5 | — | — | 0,2 | 0,2 |
| B 25 | Chronische, rheumatische Herzerkrankungen (42) .. | 1,5 | 1,1 | — | — | 0,1 | 0,1 |
| B 26 | Arteriosklerotische und degenerative Herzerkrankungen (451, 452, 455, 456) | 191,4 | 222,5 | 1,8 | 0,6 | 0,7 | 3,1 |
| B 27 | Sonstige Herzerkrankungen (43, 44, 459) | 20,8 | 22,9 | 2,7 | 0,6 | 0,4 | 1,5 |
| B 28 | Blutdruckerhöhung mit Beteiligung des Herzens (461, 462) | 14,5 | 11,0 | — | — | — | 0,02 |
| B 29 | Blutdruckerhöhung ohne Beteiligung des Herzens (463, 464) | 3,6 | 3,0 | — | — | — | — |
| B 30 | Grippe (52) | 20,1 | 21,7 | 48,2 | 6,8 | 1,9 | 3,2 |
| B 31 | Lungenentzündung (53) | 41,2 | 45,1 | 297,6 | 13,6 | 2,2 | 2,2 |
| B 32 | Bronchitis (54) | 16,9 | 23,4 | 20,8 | 1,5 | 0,2 | 0,3 |
| B 33 | Geschwüre des Magens und des Zwölffingerdarms (61) | 5,9 | 10,2 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,6 |
| B 34 | Blinddarmentzündung (63) | 4,1 | 5,1 | 0,9 | 4,6 | 1,7 | 2,4 |
| B 35 | Darmverschluß und Hernien (64, 65) | 11,0 | 11,5 | 34,0 | 3,1 | 0,5 | 0,9 |
| B 36 | Gastritis, Zwölffingerdarm-, Dünndarm- und Dickdarmentzündung mit Ausnahme des Durchfalls der Neugeborenen (621, 661, 662) | 3,5 | 3,6 | 46,9 | 5,0 | 0,4 | 0,3 |
| B 37 | Leberzirrhose (672) | 14,8 | 20,2 | 0,9 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| B 38 | Nephritis und Nephrose (70) | 10,5 | 11,6 | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 2,3 |
| B 39 | Prostata-Hyperplasie (721) | 11,1 | 23,7 | — | — | — | — |
| B 40 | Komplikationen der Schwangerschaft, der Geburt und des Wochenbetts (75—77 ¹⁾ | 127,6 | — | — | — | — | — |
| B 41 | Angeborene Mißbildungen (83) | 9,7 | 11,1 | 507,7 | 10,4 | 2,2 | 1,3 |
| B 42 | Geburtsverletzungen, postnatale Asphyxie und Atelektase (841, 842) | 8,9 | 11,6 | 623,4 | — | — | — |
| B 43 | Infektionen der Neugeborenen (843—845) | 2,8 | 3,6 | 192,3 | — | — | — |
| B 44 | Sonstige Erkrankungen der frühen Kindheit und Unreife ohne nähere Angaben (846, 847, 849, 85) .. | 28,4 | 35,2 | 1 886,1 | — | — | — |
| B 45 | Altersschwäche ohne Geistesstörung, Krankheitszeichen (-Symptome) und mangelhaft bezeichnete Todesursachen (891, 896—899) | 74,3 | 72,4 | 62,5 | 5,6 | 1,1 | 2,2 |
| B 46 | Alle sonstigen Erkrankungen (30—32, 34—36, 382—389, 39, 47—51, 55—60, 629, 663, 669, 671, 679, 68, 69, 71, 728, 729, 73, 74, 78—82, 868, 869, 87, 88, 892) | 127,1 | 137,8 | 167,3 | 23,4 | 7,0 | 11,0 |
| BE 47 | Kraftfahrzeugunfälle (90) | 23,6 | 40,8 | 0,9 | 12,7 | 14,0 | 65,3 |
| BE 48 | Alle sonstigen Unfälle (91—96) | 34,3 | 44,3 | 66,3 | 32,7 | 15,6 | 37,2 |
| BE 49 | Selbstmord und Selbstverstümmelung (97) | 18,4 | 25,2 | — | — | 0,7 | 18,1 |
| BE 50 | Mord und Kriegshandlungen (98, 99) | 0,9 | 1,2 | 10,9 | 1,0 | 0,7 | 1,1 |
| BI-BE 50 | Sterbefälle insgesamt (00—99) | 1 130,7 | 1 254,9 | 4 073,8 | 155,3 | 64,3 | 173,2 |

¹⁾ Auf 100 000 Lebendgeborene.