

9. Düngemittellieferungen für den Verbrauch in der Landwirtschaft

a) Nach Ländern

Wirtschaftsjahr — Land	Gesamtlieferungen				Je ha landwirtschaftl. Nutzfläche			
	Stickstoff (N)	Phosphat (P ₂ O ₅)	Kali (K ₂ O)	Kalk (CaO)	Stickstoff (N)	Phosphat (P ₂ O ₅)	Kali (K ₂ O)	Kalk (CaO)
	1 000 t Nährstoff				kg Nährstoff			
1958/64 WjD	660,6	691,0	1 054,0	582,2 ¹⁾	46,3	48,5	73,9	40,8 ¹⁾
1959/60	624,9	729,8	1 047,2	707,8	43,6	50,9	73,0	49,3
1960/61	618,6	662,4	1 006,5	535,0	43,4	46,4	70,6	37,5
1961/62	621,5	633,9	1 036,5	544,3	43,7	44,6	72,9	38,3
1962/63	773,8	718,8	1 099,8	484,4	54,5	50,7	77,5	34,1
1963/64	746,5	764,0	1 125,3	490,7	52,7	53,9	79,4	34,6
1964/65	784,6	815,6	1 184,0	554,0	55,5	57,7	83,8	39,2
davon (1964/65):								
Schleswig-Holstein und Hamburg	84,4	78,5	92,3	47,5	69,4	64,6	75,9	39,1
Niedersachsen und Bremen	204,6	182,8	288,5	168,8	69,5	62,1	98,0	57,3
Nordrhein-Westfalen	146,5	126,9	210,9	123,0	72,7	63,0	104,6	61,0
Hessen	52,7	57,3	74,1	29,0	52,4	56,9	73,6	28,8
Rheinland-Pfalz	53,3	58,9	74,0	30,1	55,5	61,4	77,2	31,4
Baden-Württemberg	70,7	92,0	127,5	23,3	37,3	48,5	67,3	12,3
Bayern	168,1	214,8	311,5	129,9	42,6	54,4	78,9	32,9
Saarland	3,9	3,9	4,6	1,3	29,4	29,4	34,8	9,7
Berlin (West)	0,4	0,4	0,6	1,1	31,5	27,2	44,5	87,4

b) Nach Düngerarten

1 000 t Nährstoff

Düngerart	Wirtschaftsjahr				Düngerart	Wirtschaftsjahr			
	1961/62	1962/63	1963/64	1964/65		1961/62	1962/63	1963/64	1964/65
Stickstoff (N)	621,5	773,8	746,5	784,6	Kali (K ₂ O)	1 036,5	1 099,8	1 253,3	1 184,0
Kalkstickstoff	85,3	91,8	95,7	98,6	Kainitsorten	22,9	16,0	20,4	20,7
Ammonsulfat ²⁾	37,7	39,9	35,9	37,3	40er Kalidüngesalz ³⁾	359,9	343,8	360,7	338,2
Ammonsalpetersorten ³⁾	293,6	384,2	368,4	399,9	50er Kalidüngesalz	199,1	202,9	201,8	228,6
Salpetersorten ⁴⁾	25,8	35,7	25,0	24,0	Kalisulfat und Kalimagnesia	41,5	39,4	35,6	32,1
Mehrnährstoffdünger	179,1	222,2	221,5	224,9	Mehrnährstoffdünger	413,2	497,7	506,7	564,3
Phosphat (P ₂ O ₅)	633,9	718,8	764,0	815,6	Kalk (CaO)	544,3	484,4	490,7	554,0
Superphosphat	33,0	35,2	33,7	32,7	Brantkalk ⁵⁾	323,5	286,6	280,2	297,9
Thomasphosphat	325,3	352,8	391,4	382,6	Mischkalk	18,8	15,9	12,6	19,6
Sonstige Phosphatsorten ⁶⁾	11,8	13,2	12,1	32,0	Kohlensaurer Kalk	164,5	143,9	141,4	163,1
Mehrnährstoffdünger	263,8	317,6	326,7	368,3	Hüttenkalk	37,5	38,0	56,6	73,4

¹⁾ Bis einschl. 1958/59 ohne Saarland. — ²⁾ Einschl. Ammoniak (flüssig), Harnstoff und Stickstoff-Magnesiumsulfat. — ³⁾ Ammonsulfat-salpeter und Kalkammonsalpeter. — ⁴⁾ Einschl. Chilesalpeter. — ⁵⁾ Glühphosphate und weicherde Rophosphate. — ⁶⁾ Einschl. 40er Kornkali mit 5% Mg O. — ⁷⁾ Einschl. Sieb- und Abfallkalk (65% CaO).

10. Holzeinschlag*)

1 000 Festmeter Derbholz ohne Rinde

Forstwirtschaftsjahr — Land	Ins- gesamt	Stammholz ¹⁾				Grubenholz		Schichtnutzholz ²⁾		Brennholz		
		Eiche	Rot- buche	Anderes Laubholz	Fichte, Tanne	Kiefer, Lärche	Laub- holz	Nadel- holz	Laub- holz	Nadel- holz	Laub- holz	Nadel- holz
1962	27 778	817	2 253	234	11 101	2 649	167	1 553	1 571	2 640	3 677	1 116
1963	23 579	724	1 966	207	8 775	1 946	121	1 268	1 413	2 053	4 000	1 106
1964	26 262	788	2 234	223	9 594	2 331	165	1 492	1 740	2 435	4 144	1 116
1965	26 336	780	2 305	216	9 733	2 479	164	1 452	2 006	2 562	3 596	1 043
davon (1965):												
Schleswig-Holstein und Hamburg	490	24	102	8	116	23	—	11	49	27	110	20
Niedersachsen und Bremen	3 146	120	439	31	769	558	8	250	352	172	385	62
Nordrhein-Westfalen	2 429	126	295	26	869	86	40	214	300	146	310	17
Hessen	3 607	103	532	10	841	396	23	205	422	337	698	40
Rheinland-Pfalz	2 619	120	231	15	701	269	65	212	329	136	513	28
Baden-Württemberg	6 439	138	305	85	3 181	295	3	131	182	854	983	282
Bayern	7 203	126	324	40	3 194	835	20	410	236	877	551	590
Saarland	403	23	77	1	62	17	5	19	136	13	46	4

*) Bundesgebiet ohne Berlin.

¹⁾ Einschl. Derbstangen, Masten- und Schwellenholz. — ²⁾ Einschl. Faserholz.

Quelle: Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Bonn