

1. Neuerkrankungen an ausgewählten meldepflichtigen Krankheiten

a) Nach Jahren

Jahr	Enteritis infectiosa ¹⁾		Übertragbare Gehirnentzündung	Übertragbare Kinderlähmung		Paratyphus A u. B	Ruhr		Typhus abdominalis	Diphtherie
	Salmonellose	übrige Formen		insgesamt	darunter paralyt. Fälle		bakterielle Ruhr	Amöbenruhr		
Anzahl										
1950	2 016		228	2 911	.	5 704	1 299		5 735	42 888
1960	3 047		122	4 193	3 159 ²⁾	2 406	3 251		1 548	1 965
1962	2 254	242	164	296	222 ²⁾	994	1 653	28	1 157	813
1963	5 118	321	166	241	199 ²⁾	1 147	1 892	38	1 112	662
1964	4 020	382	193	54	43	1 095	4 249	42	997	637
1965	5 913	428	137	48	37	640	1 381	27	744	307
1966	7 189	418	154	17	16	739	1 110	32	1 015	201
auf 100 000 Einwohner										
1950	4,0		0,5	5,8	.	11,4	2,6		11,5	85,8
1960	5,5		0,2	7,5	5,7 ²⁾	4,3	5,8		2,8	3,5
1962	4,0	0,4	0,3	0,5	0,4 ²⁾	1,7	2,9	0,05	2,0	1,4
1963	8,9	0,6	0,3	0,4	0,4 ²⁾	2,0	3,3	0,1	1,9	1,1
1964	6,9	0,7	0,3	0,1	0,1	1,9	7,3	0,1	1,7	1,1
1965	10,0	0,7	0,2	0,1	0,1	1,1	2,3	0,05	1,3	0,5
1966	12,0	0,7	0,3	0,03	0,03	1,2	1,9	0,1	1,7	0,3

Jahr	Scharlach	Brucellose		Übertragbare Hirnhautentzündg.		Hepatitis infectiosa ²⁾	Leptospirose		Tuberkulose ⁴⁾	
		insgesamt	darunter Bang'sche Krankheit	Meningokokken-Meningitis	übrige Formen		insgesamt	darunter Weil'sche Krankheit	insgesamt	darunter Atmungsorgane
Anzahl										
1950	95 793	203	.	801	6 911 ⁵⁾	200	.	132 639 ²⁾	115 572 ²⁾	
1960	28 908	252	.	859	.	82	.	70 325 ²⁾	60 173 ²⁾	
1962	25 289	167	159	1 075	797 ²⁾	14 708	47	27	58 968	49 449
1963	32 585	143	136	1 835	1 560 ²⁾	14 077	53	23	57 305	48 503
1964	49 293	89	80	1 473	2 205	17 126	45	31	55 204	46 509
1965	40 627	100	89	1 177	1 637	19 759	43	24	55 010	46 513
1966	39 956	102	91	1 285	2 731	21 472	76	20
auf 100 000 Einwohner										
1950	191,6	0,4	.	1,6	15,3 ⁵⁾	0,4	.	270,4 ²⁾	235,6 ²⁾	
1960	51,9	0,5	.	1,5	.	0,1	.	128,2 ²⁾	109,7 ²⁾	
1962	44,4	0,3	0,3	1,9	1,4 ²⁾	25,8	0,1	0,05	103,6	86,8
1963	56,6	0,2	0,2	3,2	2,8 ²⁾	24,4	0,1	0,04	99,5	84,2
1964	84,4	0,2	0,1	2,5	3,8	29,3	0,1	0,1	94,5	79,6
1965	63,8	0,2	0,2	2,0	2,8	33,5	0,1	0,04	93,2	78,8
1966	67,0	0,2	0,2	2,2	4,6	36,0	0,1	0,03

b) 1966 nach Ländern

Land	Enteritis infectiosa ¹⁾		Paratyphus A u. B	Ruhr		Typhus abdominalis	Diphtherie	Scharlach	Hepatitis infectiosa ²⁾	Toxoplasmosose
	Salmonellose	übrige Formen		bakterielle Ruhr	Amöbenruhr					
Schleswig-Holstein ..	266	2	34	16	—	33	2	1 799	564	17
Hamburg	421	—	26	32	1	19	2	1 950	669	2
Niedersachsen	590	43	65	12	1	96	19	3 770	1 455	47
Bremen	113	8	24	2	—	10	1	541	264	4
Nordrhein-Westfalen	1 516	140	201	151	2	310	57	9 526	5 734	60
Hessen	221	5	51	86	23	71	5	3 400	1 823	109
Rheinland-Pfalz	131	33	79	29	—	225	21	1 327	1 494	59
Baden-Württemberg	1 096	38	125	244	2	119	6	6 662	3 798	41
Bayern	2 350	140	109	289	—	98	84	8 498	4 074	79
Saarland	125	5	13	10	—	4	1	775	762	11
Berlin (West)	360	4	12	239	3	30	3	1 708	835	297
Bundesgebiet ...	7 189	418	739	1 110	32	1 015	201	39 956	21 472	726

¹⁾ Magen-Darmentzündung bzw. Lebensmittelvergiftung. — ²⁾ Ohne Saarland. — ³⁾ Übertragbare Gelbsucht. — ⁴⁾ Neuzugänge im Berichtsjahr. — ⁵⁾ Ohne Bremen, Reg.-Bez. Südwürttemberg-Hohenzollern, Saarland und Berlin. — ⁶⁾ Ohne kreisfreie Stadt Wuppertal.