

11. Düngemittellieferungen für den Verbrauch in der Landwirtschaft

a) Nach Ländern

Wirtschaftsjahr — Land	Gesamtlieferungen				Je ha landwirtschaftl. Nutzfläche			
	Stickstoff (N)	Phosphat (P ₂ O ₅)	Kali (K ₂ O)	Kalk (CaO)	Stickstoff (N)	Phosphat (P ₂ O ₅)	Kali (K ₂ O)	Kalk (CaO)
	1 000 t Nährstoff				kg Nährstoff			
1959/60-1964/65 WjD	695,0	720,7	1 083,2	552,7	48,9	50,7	76,2	38,9
1960/61	618,6	662,4	1 006,5	535,0	43,4	46,4	70,6	37,5
1961/62	621,5	633,9	1 036,5	544,3	43,7	44,6	72,9	38,3
1962/63	773,8	718,8	1 099,8	484,4	54,5	50,7	77,5	34,1
1963/64	746,5	764,0	1 125,3	490,7	52,7	53,9	79,4	34,6
1964/65	784,6	815,6	1 184,0	554,0	55,5	57,7	83,8	39,2
1965/66	873,8	833,2	1 190,3	548,2	62,1	59,2	84,6	39,0
davon (1965/66):								
Schleswig-Holstein und Hamburg	90,9	81,1	96,7	40,5	75,4	67,3	80,2	33,5
Niedersachsen und Bremen	220,5	191,1	289,8	156,2	74,3	64,4	97,7	52,6
Nordrhein-Westfalen	164,7	127,3	211,9	116,9	82,3	63,6	105,9	58,4
Hessen	54,0	54,0	69,6	29,3	54,5	54,0	70,2	29,5
Rheinland-Pfalz	55,8	57,5	74,9	25,1	57,8	59,6	77,6	26,0
Baden-Württemberg	80,3	94,5	128,5	25,7	42,6	50,1	68,1	13,6
Bayern	203,3	223,6	313,5	152,5	52,0	57,2	80,2	39,0
Saarland	3,9	3,9	4,9	1,0	29,4	29,5	36,5	7,5
Berlin (West)	0,4	0,3	0,6	1,1	30,7	27,2	45,9	9,3

b) Nach Düngerarten

1 000 t Nährstoff

Düngerart	Wirtschaftsjahr				Düngerart	Wirtschaftsjahr			
	1962/63	1963/64	1964/65	1965/66		1962/63	1963/64	1964/65	1965/66
Stickstoff (N)	773,8	746,5	784,6	873,8	Kali (K ₂ O)	1 099,8	1 253,3	1 184,0	1 190,3
Kalkstickstoff	91,8	95,7	98,6	108,2	Kainitsorten	16,0	20,4	20,7	16,8
Ammonsulfat ¹⁾	39,9	35,9	37,3	38,8	40er Kalidüngesalz ²⁾	343,8	360,7	338,2	332,3
Ammonsalpetersorten ³⁾	384,2	368,4	399,9	458,9	50er Kalidüngesalz	202,9	201,8	228,6	221,6
Salpetersorten ⁴⁾	35,7	25,0	24,0	23,9	Kalisulfat und Kalmagnesia	39,4	35,6	32,1	31,9
Mehrnährstoffdünger	222,2	221,5	224,9	243,9	Mehrnährstoffdünger	497,7	506,7	564,3	587,7
Phosphat (P ₂ O ₅)	718,8	764,0	815,6	833,2	Kalk (CaO)	484,4	490,7	554,0	548,2
Superphosphat	35,2	33,7	32,7	26,7	Brantkalk ⁵⁾	286,6	280,2	297,9	313,4
Thomasphosphat	352,8	391,4	382,6	400,5	Mischkalk	15,9	12,6	19,6	16,6
Sonstige Phosphatsorten ⁴⁾	13,2	12,1	32,0	18,2	Kohlensaurer Kalk	143,9	141,4	163,1	140,8
Mehrnährstoffdünger	317,6	326,7	368,3	387,8	Hüttenkalk	38,0	56,6	73,4	77,4

¹⁾ Einschl. Ammoniakgas, Harnstoff und Stickstoff-Magnesiumsulfat. — ²⁾ Ammonsulfatsalpeter und Kalkammonsalpeter. — ³⁾ Einschl. Natronsalpeter (Chilesalpeter). — ⁴⁾ Glühphosphate und weicherde Rophosphate. — ⁵⁾ Einschl. Korn-Kali mit MgO. — ⁶⁾ Einschl. Sieb- und Abfallkalk (ca. 65% CaO).

12. Holzeinschlag*)

1 000 Festmeter Derbholz ohne Rinde

Forstwirtschaftsjahr — Land	Ins- gesamt	Stammholz ¹⁾					Grubenholz		Schichtnutzholz ²⁾		Brennholz	
		Eiche	Rot- buche	Anderes Laubholz	Fichte, Tanne	Kiefer, Lärche	Laub- holz	Nadel- holz	Laub- holz	Nadel- holz	Laub- holz	Nadel- holz
1963	23 579	724	1 966	207	8 775	1 946	121	1 268	1 413	2 053	4 000	1 106
1964	26 262	788	2 234	223	9 594	2 331	165	1 492	1 740	2 435	4 144	1 116
1965	26 336	780	2 305	216	9 733	2 479	164	1 452	2 006	2 562	3 596	1 043
1966	27 680	833	2 612	231	11 259	2 511	177	1 400	1 925	2 650	3 169	913
davon (1966):												
Schleswig-Holstein und Hamburg	421	21	99	8	89	22	—	8	52	20	86	16
Niedersachsen und Bremen	3 101	123	472	30	792	526	10	224	337	185	350	52
Nordrhein-Westfalen	2 969	146	343	37	1 170	102	43	258	310	219	325	16
Hessen	3 737	108	592	9	1 072	387	28	187	390	346	588	30
Rheinland-Pfalz	2 724	137	288	13	793	283	72	232	312	141	434	19
Baden-Württemberg	7 245	147	365	89	3 984	337	3	111	212	880	858	259
Bayern	7 124	129	367	43	3 295	838	18	362	217	843	495	517
Saarland	359	22	86	2	64	16	3	18	95	16	33	4

*) Bundesgebiet ohne Berlin.

¹⁾ Einschl. Derbstangen, Masten- und Schwellenholz. — ²⁾ Einschl. Faserholz.

Quelle: Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Bonn