

10. Düngemittellieferungen für den Verbrauch in der Landwirtschaft

a) Nach Ländern

Wirtschaftsjahr Land	Gesamtlieferungen				Je ha landwirtschaftl. genutzter Fläche			
	Stickstoff (N)	Phosphat (P ₂ O ₅)	Kali (K ₂ O)	Kalk (CaO)	Stickstoff (N)	Phosphat (P ₂ O ₅)	Kali (K ₂ O)	Kalk (CaO)
	1 000 t Nährstoff				kg Nährstoff			
1963/64 - 1968/69 WjD	863	804	1 124	555	62,3	58,0	81,2	40,1
1967/68	950	806	1 119	572	68,9	58,5	81,2	41,5
1968/69	933	802	1 046	574	68,4	58,8	76,7	42,1
1969/70	1 085	857	1 120	646	79,7	62,9	82,3	47,5
davon (1969/70):								
Schleswig-Holstein und Hamburg .	129	90	98	62	108,4	75,7	82,7	51,9
Niedersachsen und Bremen	279	197	270	207	96,1	67,7	92,9	71,1
Nordrhein-Westfalen	199	120	179	132	102,5	61,8	92,4	68,1
Hessen	65	56	66	39	68,8	59,0	69,8	41,5
Rheinland-Pfalz	65	58	75	31	71,5	63,4	82,0	33,7
Baden-Württemberg	100	98	122	19	55,2	54,0	66,9	10,3
Bayern	241	233	304	154	63,9	61,9	80,7	40,8
Saarland	5	4	5	2	40,9	35,2	40,0	19,8
Berlin (West)	0	0	0	1	81,8	62,5	95,0	146,0

b) Nach Düngerarten

1 000 t Nährstoff

Düngerart	Wirtschaftsjahr				Düngerart	Wirtschaftsjahr			
	1966/67	1967/68	1968/69	1969/70		1966/67	1967/68	1968/69	1969/70
Stickstoff (N)	889	950	933	1 085	Kali (K ₂ O)	1 077	1 119	1 046	1 120
Kalkstickstoff	109	101	84	75	40er Kalidüngesalz ¹⁾	279	291	253	254
Ammonsulfat ¹⁾	32	30	28	26	50er Kalidüngesalz	189	203	181	178
Ammonsalpetersorten ²⁾	473	523	515	631	Kalisulfat und Kalimagnesia	26	27	19	22
Salpetersorten	20	17	14	14	Mehrnährstoffdünger	582	598	593	666
Mehrnährstoffdünger	255	279	292	338					
Phosphat (P ₂ O ₅)	801	806	802	857	Kalk (CaO)	588	572	574	646
Superphosphat	29	21	18	18	Branntkalk	337	329	310	359
Thomasphosphat	370	346	324	300	Kohlensaurer Kalk	136	132	144	161
Sonstige Phosphatsorten ³⁾	11	21	24	30	Hüttenkalk	89	85	94	101
Mehrnährstoffdünger	391	418	435	508	Andere Kalkdünger ⁴⁾	27	26	26	25

¹⁾ Einschl. Ammoniakgas, Ammonitrat-Harnstoff-Lösung und Harnstoff, 1969/70 ohne Ammonitrat-Harnstoff-Lösung. — ²⁾ 1969/70 einschl. Ammonitrat-Harnstoff-Lösung. — ³⁾ Glühphosphate und weicherde Rophosphate; ab 1967/68 auch teilaufgeschlossenes Rophosphat. — ⁴⁾ Einschl. Korn-Kali mit Magnesiumoxyd und Kainit. — ⁵⁾ Misch- und Abfallkalk.

11. Holzeinschlag*)

1 000 Festmeter Derbholz ohne Rinde

Forstwirtschaftsjahr Land	Insgesamt	Stammholz ¹⁾					Grubenholz		Schichtnutzholz ²⁾		Brennholz	
		Eiche	Rotbuche	Anderes Laubholz	Fichte, Tanne	Kiefer, Lärche	Laubholz	Nadelholz	Laubholz	Nadelholz	Laubholz	Nadelholz
1967	27 399	777	2 256	218	12 022	2 162	96	840	1 860	3 418	2 795	955
1968	24 274	744	2 126	186	9 573	1 746	92	1 074	2 207	3 193	2 568	765
1969	26 947	859	2 654	228	10 469	2 384	173	1 242	2 672	3 079	2 489	698
1970	28 196	905	2 795	258	10 666	2 519	193	1 287	2 857	3 889	2 181	646
davon (1970):												
Schleswig-Holstein und Hamburg	497	27	113	10	137	19	—	7	68	51	49	16
Niedersachsen und Bremen	3 368	129	457	35	789	517	11	161	524	512	202	31
Nordrhein-Westfalen	2 794	134	336	41	1 104	101	40	235	411	219	159	14
Hessen	3 519	138	678	10	769	430	36	217	567	338	330	6
Rheinland-Pfalz	2 834	154	351	19	761	280	85	210	446	237	261	30
Baden-Württemberg	7 341	172	420	97	3 717	328	4	109	441	1 082	783	188
Bayern ³⁾	7 486	125	358	44	3 331	828	14	329	304	1 434	362	357
Saarland	357	26	82	2	58	16	3	19	96	16	35	4

*) Bundesgebiet ohne Berlin.

¹⁾ Einschl. Derbstangen, Masten- und Schwellenholz. — ²⁾ Einschl. Faserholz. — ³⁾ Kalenderjahr.

Quelle: Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Bonn