

13.1 Sterbefälle nach Todesursachen

je 100 000 Einwohner

Pos.-Nr. der ICD <sup>1)</sup>	Todesursache	Spanien <sup>6)</sup>	Tschechoslowakei	Ungarn	Ägypten <sup>7)</sup>	Kenia	Südafrika <sup>8)</sup>	Chile	Ecuador <sup>9)</sup>	Guatemala	Kanada <sup>10)</sup>
		1974	1973	1975	1973	1970	1971	1972	1974	1972	1974
B 1	Cholera	—	—	—	—	0,0	—	—	—	—	—
B 2	Typhus (Typhus abdominalis)	0,1	0,0	0,0	1,5	23,2	0,1	0,5	1,3	1,7	0,0
B 3	Bakterielle Ruhr und Amöbeninfektion	—	0,1	0,0	0,0	1,2	0,3	0,1	0,9	3,9	0,0
B 4	Enteritis und sonstige Durchfallkrankheiten	2,9	0,3	2,0	6,2	41,3	92,2	34,6	110,4	250,8	1,2
B 5	Tuberkulose der Atmungsorgane	6,8	6,5	10,2	6,9	4,6	16,0	21,0	16,0	14,4	1,0
B 6	Sonstige Formen der Tuberkulose, einschl. der Spätfolgen	0,7	0,5	2,8	0,6	0,8	3,0	2,1	2,0	6,4	0,5
B 7	Pest	—	—	—	—	0,0	—	—	—	—	—
B 8	Diphtherie	0,0	—	0,0	0,7	0,1	0,3	0,9	0,3	0,3	0,0
B 9	Keuchhusten	0,0	—	—	0,1	50,6	0,9	1,0	21,7	53,2	0,0
B 10	Durch Streptokokken hervorgerufene Rachenkrankheiten und Scharlach	0,0	0,0	0,0	—	0,1	0,0	0,0	—	0,0	0,0
B 11	Meningokokkeninfektion	1,1	0,0	0,1	0,7	0,0	1,0	0,0	0,0	—	0,2
B 12	Akute Poliomyelitis	0,1	—	—	0,3	0,3	0,0	0,1	0,6	1,1	0,0
B 13	Pocken	—	—	—	—	8,4	—	—	—	—	—
B 14	Masern	0,2	0,1	0,0	2,3	18,7	8,2	1,7	47,3	40,9	0,1
B 15	Fleckfieber und sonstige Rickettsiosen	—	—	—	—	0,0	0,0	—	0,1	0,0	—
B 16	Malaria	0,0	—	—	0,0	6,5	0,2	—	0,6	0,4	—
B 17	Syphilis (Lues) und ihre Folgeerscheinungen	0,6	0,3	0,5	0,0	0,2	1,0	0,1	0,2	0,3	0,1
B 18	Alle sonstigen infektiösen und parasitären Krankheiten	4,7	2,3	3,0	10,7	9,4	8,6	17,3	19,1	90,8	1,8
B 19	Bösartige Neubildungen, einschl. der Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	145,9	225,7	242,1	20,0	6,1	110,3	99,1	34,8	27,9	150,1
B 20	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbekanntes Charakters	0,4	3,1	4,3	0,6	0,1	0,5	4,0	3,6	1,9	1,4
B 21	Diabetes mellitus	18,8	16,7	7,2	6,7	1,0	8,2	10,5	5,2	4,5	14,1
B 22	Avitaminosen und sonstige Ernährungs- mangelkrankheiten	0,7	0,1	0,1	3,0	8,3	4,0	8,4	16,4	28,8	0,8
B 23	Anämien	1,7	1,1	1,3	1,4	5,0	1,8	1,2	20,5	28,3	1,4
B 24	Meningitis	1,2	1,1	1,7	1,4	6,0	4,2	7,3	4,0	2,4	0,4
B 25	Akutes rheumatisches Fieber	0,1	0,0	0,1	1,0	0,1	0,3	0,2	0,6	0,4	0,1
B 26	Chronische rheumatische Herzkrankheiten	15,2	13,5	8,7	22,9	0,9	5,0	6,1	1,9	0,3	5,2
B 27	Bluthochdruck	6,3	10,3	63,0	34,1	2,0	23,0	6,3	5,9	2,5	6,7
B 28	Ischämische Herzkrankheiten	73,3	270,4	240,3	18,8	0,1	147,7	65,2	16,2	6,5	230,5
B 29	Sonstige Formen von Herzkrankheiten	90,1	20,3	49,2	42,1	2,8	33,5	30,3	39,0	18,4	18,5
B 30	Hirngefäßkrankheiten	142,3	187,6	172,5	7,1	18,6	94,9	63,5	22,3	13,7	73,3
B 31	Grippe	12,9	6,9	14,5	0,1	0,0	2,1	10,5	25,7	99,7	2,0
B 32	Pneumonie	35,1	36,5	10,3	40,4	38,7	83,2	113,2	61,8	98,0	23,2
B 33	Bronchitis, Emphysem und Asthma	32,4	60,9	34,6	79,5	9,5	29,2	10,8	70,3	41,6	13,7
B 34	Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür	6,0	6,2	9,2	0,8	0,3	4,5	3,3	3,2	1,3	3,5
B 35	Appendizitis	0,6	1,2	1,6	0,2	0,0	0,4	1,1	0,7	0,4	0,4
B 36	Darmverschluss und Eingeweidebruch	5,5	5,6	6,9	1,7	1,7	2,8	4,0	6,5	4,0	2,9
B 37	Leberzirrhose	22,5	16,9	18,2	10,8	4,1	13,1	48,5	5,6	7,9	11,7
B 38	Nephritis und Nephrose	10,2	7,2	8,2	8,0	0,6	5,5	7,0	8,8	2,5	2,5
B 39	Prostatahypertrophie <sup>11)</sup>	25,1	36,9	34,0	—	—	—	—	15,9	—	7,3
B 40	Fehlgeburt <sup>12)</sup>	3,4	1,1	4,6	5,6	15,8	15,6	41,4	16,4	13,2	0,9
B 41	Sonstige Komplikationen der Schwangerschaft, bei der Entbindung und im Wochenbett <sup>12)</sup>	23,2	12,7	22,1	86,9	188,1	51,6	78,1	187,3	136,6	9,3
B 42	Angeborene Mißbildungen	7,0	8,8	12,0	3,1	5,7	9,5	9,5	4,5	4,1	7,6
B 43	Geburtsverletzungen, Regelwidrigkeit der Geburt und sonstige durch Anoxie und Hypoxie hervorgerufene Zustände <sup>12)</sup>	121,6	607,9	1 510,5	16,0	2,2	1 190,2	1 164,4	209,4	168,1	359,9
B 44	Sonstige Ursachen der perinatalen Mortalität <sup>12)</sup>	214,1	581,7	592,6	1 752,3	618,2	1 272,4	1 319,0	687,4	974,8	349,2
B 45	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen	47,8	14,2	1,1	293,2	28,8	35,3	64,0	170,2	224,9	7,1
B 46	Alle sonstigen Todesursachen	101,3	121,6	172,5	495,6	45,0	74,7	79,9	71,4	62,1	73,2
BE 47	Kraftfahrzeugunfälle	13,6	20,3	18,0	1,5	1,0	45,1	17,9	19,4	7,8	28,1
BE 48	Alle sonstigen Unfälle	25,5	37,2	42,2	—	5,2	32,9	19,3	32,7	27,6	29,5
BE 49	Selbstmord und Selbstbeschädigung	4,0	22,4	38,4	45,4	0,2	10,8	5,4	2,6	3,4	12,9
BE 50	Alle sonstigen Gewalteinwirkungen	0,4	2,1	3,3	—	11,4	12,7	52,7	7,4	18,1	4,5
B1—BE 50	<b>Insgesamt</b>	<b>847,8</b>	<b>1 155,2</b>	<b>1 243,8</b>	<b>1 242,8</b>	<b>382,3</b>	<b>978,8</b>	<b>899,3</b>	<b>924,7</b>	<b>1 261,5</b>	<b>742,0</b>

<sup>1)</sup> Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen 1968, Liste B.

<sup>2)</sup> Einschl. Angehörige der im Ausland stationierten Streitkräfte.

<sup>3)</sup> Ohne Faröer und Grönland.

<sup>4)</sup> Einschl. im Ausland gestorbene Personen.

<sup>5)</sup> Ohne Säuglinge, die vor ihrer Registrierung starben.

<sup>6)</sup> Ohne Ceuta und Melilla.

<sup>7)</sup> Nur amtlich gemeldete Todesfälle.

<sup>8)</sup> Ohne Bantuneger.

<sup>9)</sup> Ohne indianische Nomadenstämme.

<sup>10)</sup> Einschl. Kanadier, die in den Vereinigten Staaten — ohne Amerikaner, die in Kanada — verstorben sind.

<sup>11)</sup> Je 100 000 männliche Einwohner im Alter von 50 Jahren und mehr.

<sup>12)</sup> Je 100 000 Lebendgeborene.