

## 13.1 Sterbefälle nach Todesursachen

je 100 000 Einwohner

Pos.- Nr. der ICD <sup>1)</sup>	Todesursache	Spanien <sup>2)</sup>	Tschecho- slowakei	Ungarn	Ägypten	Kenia	Süd- afrika <sup>3)</sup>	Chile	Ecuador <sup>4)</sup>	Guate- mala	Kanada <sup>5)</sup>
		1974	1975	1976	1974	1970	1971	1973	1975	1972	1974
B 1	Cholera . . . . .	—	—	—	—	0,0	—	—	—	—	—
B 2	Typhus (Typhus abdominalis) . . . . .	0,1	—	—	1,4	23,2	0,1	0,4	1,2	1,7	0,0
B 3	Bakterielle Ruhr und Amöbeninfektion . . . . .	—	0,0	0,0	0,1	1,2	0,3	0,1	0,7	3,9	0,0
B 4	Enteritis und sonstige Durchfallkrankheiten . . . . .	2,9	0,5	1,1	7,1	41,3	92,2	24,9	92,5	250,8	1,2
B 5	Tuberkulose der Atmungsorgane . . . . .	6,8	4,9	10,5	6,2	4,6	16,0	17,8	15,9	14,4	1,0
B 6	Sonstige Formen der Tuberkulose, einschl. der Spätfolgen . . . . .	0,7	0,4	3,8	0,5	0,8	3,0	1,9	1,9	6,4	0,5
B 7	Pest . . . . .	—	—	—	—	0,0	—	—	—	—	—
B 8	Diphtherie . . . . .	0,0	—	—	0,9	0,1	0,3	0,6	0,1	0,3	0,0
B 9	Keuchhusten . . . . .	0,0	0,0	0,0	0,0	50,6	0,9	0,7	15,7	53,2	0,0
B 10	Durch Streptokokken hervorgerufene Rachenkrankheiten und Scharlach . . . . .	0,0	0,0	0,0	—	0,1	0,0	—	—	0,0	0,0
B 11	Meningokokkeninfektion . . . . .	1,1	0,1	0,1	0,5	0,0	1,0	0,0	—	—	0,2
B 12	Akute Poliomyelitis . . . . .	0,1	—	—	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	1,1	0,0
B 13	Pocken . . . . .	—	—	—	—	8,4	—	—	—	—	—
B 14	Masern . . . . .	0,2	0,0	—	2,9	18,7	8,2	0,7	2,8	40,9	0,1
B 15	Fleckfieber und sonstige Rickettsiosen . . . . .	—	—	—	0,0	0,0	0,0	0,1	—	0,0	—
B 16	Malaria . . . . .	0,0	—	—	0,1	6,5	0,2	—	0,7	0,4	—
B 17	Syphilis (Lues) und ihre Folgeerscheinungen . . . . .	0,6	0,3	0,5	0,0	0,2	1,0	0,2	0,2	0,3	0,1
B 18	Alle sonstigen infektiösen und parasitären Krankheiten . . . . .	4,7	2,1	2,5	10,8	9,4	8,6	16,5	23,9	90,8	1,8
B 19	Bösartige Neubildungen, einschl. der Neu- bildungen der lymphatischen und blutbil- denden Organe . . . . .	145,9	227,0	241,1	19,9	6,1	110,3	99,4	34,9	27,9	150,1
B 20	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbekanntes Charakters . . . . .	0,4	3,1	7,7	0,6	0,1	0,5	5,0	3,5	1,9	1,4
B 21	Diabetes mellitus . . . . .	18,8	14,1	11,5	6,7	1,0	8,2	10,3	5,5	4,5	14,1
B 22	Avitaminosen und sonstige Ernährungs- mangelkrankheiten . . . . .	0,7	0,1	0,1	3,6	8,3	4,0	16,3	15,1	28,8	0,8
B 23	Anämien . . . . .	1,7	1,1	1,1	1,1	5,0	1,8	1,2	19,2	28,3	1,4
B 24	Meningitis . . . . .	1,2	1,5	1,5	1,3	6,0	4,2	6,2	3,7	2,4	0,4
B 25	Akutes rheumatisches Fieber . . . . .	0,1	0,0	0,0	1,0	0,1	0,3	0,1	0,5	0,4	0,1
B 26	Chronische rheumatische Herzkrankheiten . . . . .	15,2	12,8	8,8	20,1	0,9	5,0	6,0	2,1	0,3	5,2
B 27	Bluthochdruck . . . . .	6,3	8,9	61,1	29,8	2,0	23,0	7,5	5,1	2,5	6,7
B 28	Ischämische Herzkrankheiten . . . . .	73,3	274,5	243,6	17,2	0,1	147,7	63,9	18,2	6,5	230,5
B 29	Sonstige Formen von Herzkrankheiten . . . . .	90,1	16,8	44,9	51,9	2,8	33,5	26,0	39,5	18,4	18,5
B 30	Hirngefäßkrankheiten . . . . .	142,3	191,5	183,3	7,0	18,6	94,9	61,2	20,8	13,7	73,3
B 31	Grippe . . . . .	12,9	4,9	3,3	0,1	0,0	2,1	5,2	15,6	99,7	2,0
B 32	Pneumonie . . . . .	35,1	42,7	8,8	39,7	38,7	83,2	79,6	47,8	98,0	23,2
B 33	Bronchitis, Emphysem und Asthma . . . . .	32,4	53,1	39,7	72,3	9,5	29,2	9,4	56,8	41,6	13,7
B 34	Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür . . . . .	6,0	6,6	9,4	0,9	0,3	4,5	3,1	3,5	1,3	3,5
B 35	Appendizitis . . . . .	0,6	1,1	1,6	0,3	0,0	0,4	1,2	0,7	0,4	0,4
B 36	Darmverschluß und Eingeweidebruch . . . . .	5,5	5,6	6,6	1,9	1,7	2,8	4,2	6,8	4,0	2,9
B 37	Leberzirrhose . . . . .	22,5	17,3	19,2	10,6	4,1	13,1	33,0	5,6	7,9	11,7
B 38	Nephritis und Nephrose . . . . .	10,2	6,3	8,0	6,8	0,6	5,5	6,5	7,1	2,5	2,5
B 39	Prostatahypertrophie <sup>6)</sup> . . . . .	25,1	43,0	36,8	—	—	—	—	—	—	7,3
B 40	Fehlgeburt <sup>7)</sup> . . . . .	3,4	0,7	1,6	4,4	15,8	15,6	42,7	—	13,2	0,9
B 41	Sonstige Komplikationen der Schwangerschaft, bei der Entbindung und im Wochenbett <sup>7)</sup> . . . . .	23,2	17,6	18,3	88,5	188,1	51,6	87,0	213,0	136,6	9,3
B 42	Angeborene Mißbildungen . . . . .	7,0	9,0	11,4	10,5	5,7	9,5	10,8	5,1	4,1	7,6
B 43	Geburtsverletzungen, Regelwidrigkeit der Geburt und sonstige durch Anoxie und Hypoxie hervorgerufene Zustände <sup>7)</sup> . . . . .	121,6	600,8	1 311,2	13,3	2,2	1 190,2	1 115,5	206,7	168,1	359,9
B 44	Sonstige Ursachen der perinatalen Mortali- tät <sup>7)</sup> . . . . .	214,1	534,2	619,7	1 623,5	618,2	1 272,4	1 192,4	673,0	974,8	349,2
B 45	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen . . . . .	47,8	10,6	0,7	262,2	28,8	35,3	63,6	141,5	224,9	7,1
B 46	Alle sonstigen Todesursachen . . . . .	101,3	118,8	174,0	506,7	45,0	74,7	67,8	65,5	62,1	73,2
BE 47	Kraftfahrzeugunfälle . . . . .	13,6	18,8	16,0	1,7	1,0	45,1	16,7	19,9	7,8	28,1
BE 48	Alle sonstigen Unfälle . . . . .	25,5	38,7	42,8	16,4	5,2	32,9	23,5	33,2	27,6	29,5
BE 49	Selbstmord und Selbstbeschädigung . . . . .	4,0	21,9	40,6	0,1	0,2	10,8	5,6	2,7	3,4	12,9
BE 50	Alle sonstigen Gewaltwirkungen . . . . .	0,4	2,5	3,4	73,9	11,4	12,7	55,1	7,6	18,1	4,5
B 1—BE 50	<b>Insgesamt</b> . . . . .	<b>847,8</b>	<b>1 145,6</b>	<b>1 247,7</b>	<b>1 256,6</b>	<b>382,3</b>	<b>978,8</b>	<b>818,2</b>	<b>779,5</b>	<b>1 261,5</b>	<b>742,0</b>

1) Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen 1968, Liste B.

2) Ohne Ceuta und Melilla. — Ohne Säuglinge, die innerhalb von 24 Stunden nach ihrer Geburt starben.

3) Ohne Bantuneger.

4) Ohne indianische Nomadenstämme.

5) Einschl. Kanadier, die in den Vereinigten Staaten — ohne Amerikaner, die in Kanada — verstorben sind.

6) Je 100 000 männliche Einwohner im Alter von 50 Jahren und mehr.

7) Je 100 000 Lebendgeborene.