

13.1 Sterbefälle nach Todesursachen

je 100 000 Einwohner

Pos.- Nr. der ICD ¹⁾	Todesursache	Kolumbien	Mexiko	Uruguay	Venezuela	Vereinigte Staaten	Israel	Japan	Philip- pinen	Australien	Neu- seeland
		1970	1974	1974	1975	1975	1975	1976	1974	1975	1975
B 1	Cholera	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—
B 2	Typhus (Typhus abdominalis)	0,9	3,6	0,2	0,1	—	0,1	0,0	1,4	—	—
B 3	Bakterielle Ruhr und Amöbeninfektion	2,7	4,2	—	1,9	0,0	0,3	0,0	1,6	0,0	—
B 4	Enteritis und sonstige Durchfallkrankheiten	59,8	87,5	10,6	35,5	0,9	7,6	2,3	9,6	0,2	1,7
B 5	Tuberkulose der Atmungsorgane	10,9	13,2	5,5	7,1	1,2	0,6	8,1	69,3	0,6	1,0
B 6	Sonstige Formen der Tuberkulose, einschl. der Spätfolgen	1,6	1,6	1,6	0,7	0,4	1,1	0,4	5,8	0,3	1,3
B 7	Pest	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B 8	Diphtherie	0,8	0,2	0,0	0,2	—	—	0,0	1,3	—	—
B 9	Keuchhusten	3,0	5,2	0,4	0,9	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1
B 10	Durch Streptokokken hervorgerufene Rachenkrankheiten und Scharlach	0,0	0,0	—	0,0	0,0	—	0,0	0,0	—	—
B 11	Meningokokkeninfektion	0,1	0,0	0,8	0,1	0,1	0,3	0,0	0,4	0,1	0,2
B 12	Akute Poliomyelitis	0,7	0,3	—	0,0	0,0	0,1	—	0,5	—	—
B 13	Pocken	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B 14	Masern	10,2	0,8	1,6	6,2	0,0	0,8	0,2	8,6	0,0	0,1
B 15	Fleckfieber und sonstige Rickettsiosen	1,1	0,1	—	—	—	0,0	—	0,0	—	—
B 16	Malaria	2,9	0,1	—	0,0	—	—	0,0	2,3	0,0	—
B 17	Syphilis (Lues) und ihre Folgeerscheinungen	0,4	0,3	0,9	0,5	0,1	0,1	0,3	0,0	0,1	0,1
B 18	Alle sonstigen infektiösen und parasitären Krankheiten	19,7	20,0	12,8	21,3	4,6	6,5	2,3	26,7	2,0	3,2
B 19	Bösartige Neubildungen, einschl. der Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	42,4	36,0	183,0	54,0	171,7	120,3	124,6	30,0	147,8	160,9
B 20	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbekanntes Charakters	4,4	1,7	3,8	2,2	2,3	3,4	5,8	1,3	1,1	1,2
B 21	Diabetes mellitus	6,6	14,5	22,6	11,3	16,5	7,3	8,1	2,7	12,7	15,1
B 22	Avitaminosen und sonstige Ernährungs- mangelkrankheiten	21,5	10,1	11,9	7,7	1,2	0,9	0,4	30,3	0,5	0,3
B 23	Anämien	11,4	8,7	2,4	2,8	1,5	0,9	1,4	3,7	1,7	1,9
B 24	Meningitis	6,8	3,3	2,6	4,5	0,8	2,1	0,7	6,2	0,5	0,9
B 25	Akutes rheumatisches Fieber	0,9	0,6	0,3	0,3	—	0,0	0,3	0,2	0,1	0,1
B 26	Chronische rheumatische Herzkrankheiten	2,7	2,2	2,8	1,7	6,1	6,8	3,2	5,0	6,6	7,7
B 27	Bluthochdruck	9,8	4,2	16,7	9,0	8,1	5,9	17,5	18,3	10,3	12,1
B 28	Ischämische Herzkrankheiten	32,1	19,4	163,2	49,6	301,7	189,3	39,4	26,8	237,7	222,6
B 29	Sonstige Formen von Herzkrankheiten	41,1	47,3	42,0	21,7	23,3	23,3	49,0	22,8	31,1	21,0
B 30	Hirngefäßkrankheiten	27,8	23,5	113,4	30,5	91,1	88,3	153,6	11,6	111,4	103,4
B 31	Grippe	6,0	7,2	8,4	2,6	2,0	1,5	2,3	7,1	1,1	2,8
B 32	Pneumonie	50,8	90,1	18,6	38,9	24,1	19,3	26,5	111,2	15,5	28,4
B 33	Bronchitis, Emphysem und Asthma	30,4	14,3	19,3	8,2	12,0	17,3	11,7	17,1	29,2	34,3
B 34	Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür	4,0	4,6	3,5	1,7	3,2	3,6	5,6	10,5	4,4	4,8
B 35	Appendizitis	0,9	0,8	0,6	0,6	0,4	0,1	0,3	0,9	0,3	0,4
B 36	Darmverschluss und Eingeweidebruch	3,2	4,4	6,6	2,7	2,9	3,0	2,3	3,8	2,4	3,4
B 37	Leberzirrhose	3,0	19,4	8,1	6,7	14,8	5,9	13,7	4,1	8,0	6,1
B 38	Nephritis und Nephrose	6,1	7,2	4,7	4,4	3,8	5,9	6,0	8,9	5,4	3,7
B 39	Prostatahypertrophie ²⁾	—	7,0	—	—	5,0	27,5	6,4	—	10,9	1,1
B 40	Fehlgeburt ²⁾	1,2	6,7	25,7	—	0,9	1,0	0,9	12,2	—	—
B 41	Sonstige Komplikationen der Schwangerschaft, bei der Entbindung und im Wochenbett ³⁾	8,8	107,6	44,6	54,7	12,0	15,7	25,0	137,8	15,6	23,0
B 42	Angeborene Mißbildungen	6,5	7,0	10,3	13,7	6,2	1,0	0,9	4,7	7,9	10,9
B 43	Geburtsverletzungen, Regelwidrigkeiten der Geburt und sonstige durch Anoxie und Hypoxie hervorgerufene Zustände ³⁾	—	300,3	1 130,7	808,5	464,1	512,4	180,9	465,5	181,5	263,1
B 44	Sonstige Ursachen der perinatalen Mortalität ³⁾	—	572,7	835,6	447,2	382,4	441,3	281,9	1 223,7	536,5	400,8
B 45	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen	53,5	87,1	58,2	116,8	14,9	36,0	32,8	86,8	5,6	2,5
B 46	Alle sonstigen Todesursachen	56,4	67,4	93,6	35,1	85,9	51,2	41,7	69,9	68,5	72,3
BE 47	Kraftfahrzeugunfälle	9,3	15,3	5,5	33,4	21,5	17,9	11,5	3,2	27,5	2,2
BE 48	Alle sonstigen Unfälle	25,3	34,3	31,2	22,3	26,8	18,5	16,3	7,6	21,6	31,6
BE 49	Selbstmord und Selbstbeschädigung	2,7	2,1	10,4	5,0	12,7	7,5	17,5	1,1	11,1	9,4
BE 50	Alle sonstigen Gewalteinwirkungen	21,2	32,7	3,9	11,6	12,3	11,5	2,4	15,6	3,1	1,9
B 1-BE 50	Insgesamt	638,8	745,2	923,2	621,8	888,5	712,0	621,9	687,6	791,6	802,7

1) Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen 1968, Liste B. 2) Je 100 000 Lebendgeborene.

3) Je 100 000 männliche Einwohner im Alter von 50 Jahren und mehr.