

13.1 Sterbefälle nach Todesursachen

je 100 000 Einwohner

Pos.- Nr. der ICD ¹⁾	Todesursache	Italien	Luxem- burg ²⁾	Nieder- lande ³⁾	Nor- wegen ³⁾	Österreich	Polen	Portugal	Rumänien	Schweden	Schweiz
		1972	1976	1976	1976	1976	1976	1975	1974	1975	1976
B 1	Cholera	—	—	0,0	—	—	—	0,1	—	—	—
B 2	Typhus (Typhus abdominalis)	0,1	—	0,0	—	—	0,0	0,3	0,0	—	—
B 3	Bakterielle Ruhr und Amöbieninfektion	0,0	—	0,0	—	—	0,0	0,0	0,5	—	0,0
B 4	Enteritis und sonstige Durchfallkrankheiten	3,9	0,3	1,0	1,7	0,0	1,5	4,6	4,8	0,2	0,3
B 5	Tuberkulose der Atmungsorgane	5,5	1,7	0,3	0,3	6,3	11,2	8,6	7,1	2,3	3,2
B 6	Sonstige Formen der Tuberkulose, einschl. der Spätfolgen	0,7	0,8	0,7	1,4	1,2	0,9	1,0	0,6	2,0	0,8
B 7	Pest	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B 8	Diphtherie	0,0	—	—	—	—	—	0,3	—	0,0	—
B 9	Keuchhusten	0,1	—	—	—	—	0,0	0,1	0,2	—	—
B 10	Durch Streptokokken hervorgerufene Rachenkrankheiten und Scharlach	0,0	—	—	—	—	0,0	0,1	0,0	0,0	—
B 11	Meningokokkeninfektion	0,3	—	0,1	0,9	0,1	0,1	0,9	0,1	0,5	0,2
B 12	Akute Poliomyelitis	—	—	—	—	0,0	—	0,0	—	—	—
B 13	Pocken	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B 14	Masern	0,2	—	0,0	0,0	0,0	0,2	1,1	1,0	—	0,0
B 15	Fleckfieber und sonstige Rickettsiosen	—	—	—	—	—	0,0	0,0	—	—	—
B 16	Malaria	0,0	—	0,0	—	0,0	—	0,1	—	—	—
B 17	Syphilis (Lues) und ihre Folgeerscheinungen	0,4	0,6	0,1	0,2	0,5	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2
B 18	Alle sonstigen infektiösen und parasitären Krankheiten	3,2	4,2	2,3	2,6	1,5	4,5	5,7	3,5	3,1	3,7
B 19	Bösartige Neubildungen, einschl. der Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	187,0	245,8	206,8	201,9	255,3	154,9	129,6	124,4	237,8	212,7
B 20	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbekanntes Charakters	6,1	2,2	6,2	7,0	4,7	5,3	0,6	3,9	2,6	3,3
B 21	Diabetes mellitus	21,3	44,3	14,4	6,9	15,2	10,9	8,3	4,0	16,9	17,5
B 22	Avitaminosen und sonstige Ernährungsmangelkrankheiten	0,0	0,8	0,2	0,3	0,3	0,1	1,6	0,1	0,2	0,3
B 23	Anämien	1,4	0,8	1,1	1,4	2,0	0,8	1,4	0,3	1,3	1,8
B 24	Meningitis	0,9	—	0,8	0,7	1,5	1,2	1,8	1,6	0,9	1,2
B 25	Akutes rheumatisches Fieber	0,1	0,6	0,0	0,1	0,1	0,5	0,5	0,1	—	0,1
B 26	Chronische rheumatische Herzkrankheiten	9,4	2,2	5,9	12,2	11,2	8,6	7,6	13,1	11,5	3,2
B 27	Bluthochdruck	24,9	35,1	6,6	13,2	24,8	18,0	17,5	51,4	4,6	24,0
B 28	Ischämische Herzkrankheiten	136,6	147,3	188,7	255,1	269,2	81,7	84,2	79,4	378,0	124,0
B 29	Sonstige Formen von Herzkrankheiten	105,9	146,5	62,1	44,4	91,3	105,8	48,2	147,5	20,1	138,8
B 30	Hirngefäßkrankheiten	129,7	146,5	89,9	141,8	197,7	61,0	228,9	127,8	119,2	107,9
B 31	Grippe	3,3	10,1	8,6	6,6	5,1	1,6	3,9	0,7	4,4	16,6
B 32	Pneumonie	31,6	24,4	15,9	71,2	42,2	24,5	43,3	59,4	24,5	21,2
B 33	Bronchitis, Emphysem und Asthma	34,1	19,1	26,7	15,7	24,5	23,7	30,0	75,9	16,5	21,0
B 34	Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür	7,6	3,6	3,8	4,8	9,1	5,9	5,7	3,5	9,7	5,3
B 35	Appendizitis	1,1	1,4	0,5	0,5	1,4	1,1	0,6	0,5	0,6	1,0
B 36	Darmverschluss und Eingeweidebruch	6,5	8,7	3,7	4,7	6,2	4,3	4,5	3,5	5,7	3,4
B 37	Leberzirrhose	31,8	26,9	4,8	5,4	30,8	10,8	34,5	21,3	12,2	12,7
B 38	Nephritis und Nephrose	5,4	3,6	2,1	2,9	4,4	7,1	11,3	6,9	3,7	3,7
B 39	Prostatahypertrophie ⁴⁾	39,4	—	—	21,1	23,0	19,6	11,4	35,4	21,5	17,7
B 40	Fehlgeburt ⁵⁾	4,8	—	—	1,9	4,6	1,0	5,6	90,0	—	2,7
B 41	Sonstige Komplikationen der Schwangerschaft, bei der Entbindung und im Wochenbett ⁵⁾	41,2	51,1	5,1	11,2	17,2	13,1	37,3	30,9	2,0	5,4
B 42	Angeborene Mißbildungen	7,6	3,1	6,8	6,2	6,2	11,4	8,5	8,7	5,7	5,8
B 43	Geburtsverletzungen, Regelwidrigkeit der Geburt und sonstige durch Anoxie und Hypoxie hervorgerufene Zustände ⁵⁾	635,9	485,3	325,4	123,4	564,9	616,9	443,1	616,7	261,5	297,8
B 44	Sonstige Ursachen der perinatalen Mortalität ⁵⁾	919,3	255,4	165,5	316,0	357,9	397,5	825,5	120,2	159,2	173,9
B 45	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen	31,4	69,9	39,8	48,8	24,0	75,3	160,5	1,6	4,9	10,6
B 46	Alle sonstigen Todesursachen	77,3	221,9	71,8	71,8	121,0	158,2	79,9	75,3	103,4	76,8
BE 47	Kraftfahrzeugunfälle	25,9	25,8	17,7	12,7	28,8	52,6	34,9	—	15,1	18,8
BE 48	Alle sonstigen Unfälle	23,0	36,8	21,5	34,6	41,0	—	28,4	—	32,9	28,0
BE 49	Alle Selbstmord und Selbstbeschädigung	5,8	14,6	9,4	10,8	22,7	12,1	8,5	59,9	19,4	22,0
BE 50	Alle sonstigen Gewaltwirkungen	1,6	1,4	1,4	1,1	2,2	6,6	2,3	—	7,9	1,3
B 1–BE 50	Insgesamt	962,7	1 260,7	831,2	998,9	1 266,3	884,9	1 036,5	909,6	1 076,6	899,7

1) Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen 1968, Liste B.

2) Nur Staatsangehörige.

3) Einschl. im Ausland gestorbene Personen.

4) Je 100 000 männliche Einwohner im Alter von 50 Jahren und mehr.

5) Je 100 000 Lebendgeborene.