

13.1 Sterbefälle nach Todesursachen

je 100 000 Einwohner

| Pos.- Nr. der ICD ¹⁾ | Todesursache | Spanien ²⁾ | Tschecho- slowakei | Ungarn | Ägypten | Kenia | Süd- afrika ³⁾ | Chile | Ecuador ⁴⁾ | Guate- mala | Kanada ⁵⁾ |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|--------------|------------------------------|--------------|-----------------------|----------------|----------------------|
| | | 1975 | 1976 | 1977 | 1975 | 1970 | 1971 | 1976 | 1975 | 1972 | 1976 |
| B 1 | Cholera | — | — | — | — | 0,0 | — | — | — | — | — |
| B 2 | Typhus (Typhus abdominalis) | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 1,2 | 23,2 | 0,1 | 0,7 | 1,2 | 1,7 | — |
| B 3 | Bakterielle Ruhr und Amöbeninfektion | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,3 | 0,1 | 0,7 | 3,9 | 0,0 |
| B 4 | Enteritis und sonstige Durchfallkrankheiten | 2,5 | 0,5 | 1,3 | 6,8 | 41,3 | 92,2 | 20,0 | 92,5 | 250,8 | 1,1 |
| B 5 | Tuberkulose der Atmungsorgane | 6,7 | 5,5 | 8,9 | 5,8 | 4,6 | 16,0 | 16,7 | 15,9 | 14,4 | 0,7 |
| B 6 | Sonstige Formen der Tuberkulose, einschl. der Spätfolgen | 0,6 | 0,3 | 3,0 | 0,4 | 0,8 | 3,0 | 1,8 | 1,9 | 6,4 | 0,5 |
| B 7 | Pest | — | — | — | — | 0,0 | — | — | — | — | — |
| B 8 | Diphtherie | 0,0 | — | — | 0,9 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | 0,0 |
| B 9 | Keuchhusten | 0,0 | — | — | 0,2 | 50,6 | 0,9 | 0,7 | 15,7 | 53,2 | — |
| B 10 | Durch Streptokokken hervorgerufene Rachenkrankheiten und Scharlach | 0,0 | 0,0 | — | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | — | 0,0 | 0,0 |
| B 11 | Meningokokkeninfektion | 1,1 | 0,0 | 0,1 | 0,6 | 0,0 | 1,0 | 0,1 | — | — | 0,2 |
| B 12 | Akute Poliomyelitis | 0,0 | — | — | 0,1 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 1,1 | — |
| B 13 | Pocken | — | — | — | 0,0 | 8,4 | — | — | — | — | — |
| B 14 | Masern | 0,1 | 0,0 | — | 3,6 | 18,7 | 8,2 | 0,6 | 2,8 | 40,9 | 0,0 |
| B 15 | Fleckfieber und sonstige Rickettsiosen | — | — | — | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | — | 0,0 | — |
| B 16 | Malaria | 0,0 | — | — | 0,0 | 6,5 | 0,2 | — | 0,7 | 0,4 | — |
| B 17 | Syphilis (Lues) und ihre Folgeerscheinungen | 0,5 | 0,2 | 0,4 | 0,0 | 0,2 | 1,0 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,1 |
| B 18 | Alle sonstigen infektiösen und parasitären Krankheiten | 5,0 | 2,6 | 2,4 | 11,5 | 9,4 | 8,6 | 17,1 | 23,9 | 90,8 | 1,9 |
| B 19 | Bösartige Neubildungen, einschl. der Neu- bildungen der lymphatischen und blutbil- denden Organe | 149,8 | 223,3 | 243,7 | 19,3 | 6,1 | 110,3 | 101,5 | 34,9 | 27,9 | 151,5 |
| B 20 | Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbekannten Charakters | 0,4 | 3,0 | 5,6 | 0,5 | 0,1 | 0,5 | 2,6 | 3,5 | 1,9 | 1,6 |
| B 21 | Diabetes mellitus | 18,8 | 11,5 | 13,9 | 6,8 | 1,0 | 8,2 | 11,4 | 5,5 | 4,5 | 12,8 |
| B 22 | Avitaminosen und sonstige Ernährungs- mangelkrankheiten | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 2,3 | 8,3 | 4,0 | 12,8 | 15,1 | 28,8 | 0,8 |
| B 23 | Anämien | 1,8 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 5,0 | 1,8 | 1,4 | 19,2 | 28,3 | 1,5 |
| B 24 | Meningitis | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,3 | 6,0 | 4,2 | 4,7 | 3,7 | 2,4 | 0,5 |
| B 25 | Akutes rheumatisches Fieber | 0,1 | — | 0,0 | 1,2 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,4 | 0,1 |
| B 26 | Chronische rheumatische Herzkrankheiten | 14,6 | 11,4 | 6,6 | 19,3 | 0,9 | 5,0 | 5,0 | 2,1 | 0,3 | 5,0 |
| B 27 | Bluthochdruck | 6,6 | 9,1 | 59,6 | 28,8 | 2,0 | 23,0 | 6,5 | 5,1 | 2,5 | 6,3 |
| B 28 | Ischämische Herzkrankheiten | 79,5 | 273,2 | 250,8 | 15,9 | 0,1 | 147,7 | 56,0 | 18,2 | 6,5 | 223,3 |
| B 29 | Sonstige Formen von Herzkrankheiten | 83,4 | 17,1 | 52,2 | 85,6 | 2,8 | 33,5 | 29,7 | 39,5 | 18,4 | 19,7 |
| B 30 | Hirngefäßkrankheiten | 142,8 | 191,4 | 180,5 | 8,1 | 18,6 | 94,9 | 57,9 | 20,8 | 13,7 | 69,4 |
| B 31 | Grippe | 13,6 | 5,1 | 2,5 | 0,1 | 0,0 | 2,1 | 24,9 | 15,6 | 99,7 | 4,0 |
| B 32 | Pneumonie | 32,8 | 47,8 | 10,5 | 39,8 | 38,7 | 83,2 | 72,1 | 47,8 | 98,0 | 22,3 |
| B 33 | Bronchitis, Emphysem und Asthma | 31,6 | 54,9 | 46,5 | 73,0 | 9,5 | 29,2 | 11,4 | 56,8 | 41,6 | 12,9 |
| B 34 | Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür | 5,8 | 5,7 | 10,0 | 0,9 | 0,3 | 4,5 | 3,3 | 3,5 | 1,3 | 3,0 |
| B 35 | Appendizitis | 0,6 | 1,3 | 1,3 | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 1,0 | 0,7 | 0,4 | 0,3 |
| B 36 | Darmverschluß und Eingeweidebruch | 5,4 | 5,0 | 7,0 | 1,8 | 1,7 | 2,8 | 4,6 | 6,8 | 4,0 | 2,7 |
| B 37 | Leberzirrhose | 22,7 | 16,0 | 20,1 | 10,3 | 4,1 | 13,1 | 26,7 | 5,6 | 7,9 | 12,1 |
| B 38 | Nephritis und Nephrose | 9,4 | 6,7 | 7,7 | 6,6 | 0,6 | 5,5 | 7,7 | 7,1 | 2,5 | 2,5 |
| B 39 | Prostatahypertrophie ⁶⁾ | 21,2 | 39,1 | 34,3 | — | — | — | 36,7 | — | — | 5,4 |
| B 40 | Fehlgeburt ⁷⁾ | 1,8 | 0,3 | 2,3 | 2,6 | 15,0 | 15,6 | 42,0 | 19,0 | 13,2 | 0,6 |
| B 41 | Sonstige Komplikationen der Schwangerschaft, bei der Entbindung und im Wochenbett ⁷⁾ | 19,9 | 8,7 | 17,5 | 70,1 | 188,1 | 51,6 | 59,3 | 213,0 | 136,6 | 6,1 |
| B 42 | Angeborene Mißbildungen | 9,5 | 9,3 | 11,1 | 9,3 | 5,7 | 9,5 | 10,2 | 5,1 | 4,1 | 6,9 |
| B 43 | Geburtsverletzungen, Regelwidrigkeit der Geburt und sonstige durch Anoxie und Hypoxie hervorgerufene Zustände ⁷⁾ | 264,6 | 652,9 | 1 086,9 | 13,6 | 2,2 | 1 190,2 | 949,7 | 206,7 | 168,1 | 345,8 |
| B 44 | Sonstige Ursachen der perinatalen Mortali- tät ⁷⁾ | 561,4 | 528,2 | 513,6 | 1 367,4 | 618,2 | 1 272,4 | 414,0 | 673,0 | 974,8 | 261,1 |
| B 45 | Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen | 39,3 | 13,9 | 0,8 | 271,1 | 28,8 | 35,3 | 83,7 | 141,5 | 224,9 | 9,5 |
| BE 46 | Alle sonstigen Todesursachen | 101,1 | 117,9 | 153,3 | 470,1 | 45,0 | 74,7 | 68,0 | 65,5 | 62,1 | 76,2 |
| BE 47 | Kraftfahrzeugunfälle | 15,1 | 19,5 | 17,6 | 1,9 | 1,0 | 45,1 | 9,0 | 19,9 | 7,8 | 22,5 |
| BE 48 | Alle sonstigen Unfälle | 23,5 | 39,2 | 45,7 | 16,2 | 5,2 | 32,9 | 15,8 | 33,2 | 27,6 | 26,4 |
| BE 49 | Selbstmord und Selbstbeschädigung | 3,9 | 20,8 | 40,3 | 0,1 | 0,2 | 10,8 | 5,7 | 2,7 | 3,4 | 12,8 |
| BE 50 | Alle sonstigen Gewaltwirkungen | 0,6 | 1,8 | 2,8 | 28,7 | 11,4 | 12,7 | 40,5 | 7,6 | 18,1 | 5,1 |
| B 1—BE 50 | Insgesamt | 849,7 | 1 144,0 | 1 240,0 | 1 204,4 | 382,3 | 978,8 | 770,3 | 779,5 | 1 261,5 | 726,4 |

¹⁾ Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen 1968, Liste B.
²⁾ Ohne Ceuta und Melilla. — Ohne Säuglinge, die innerhalb von 24 Stunden nach ihrer Geburt starben.

³⁾ Ohne Bantuneger.

⁴⁾ Ohne indianische Nomadenstämme.

⁵⁾ Einschl. Kanadier, die in den Vereinigten Staaten — ohne Amerikaner, die in Kanada — verstorben sind.

⁶⁾ Je 100 000 männliche Einwohner im Alter von 50 Jahren und mehr.

⁷⁾ Je 100 000 Lebendgeborene.