

## 13.1 Sterbefälle nach Todesursachen

je 100 000 Einwohner

Pos.- Nr. der ICD <sup>1)</sup>	Todesursache	Spanien <sup>2)</sup>	Tschecho- slowakei	Ungarn	Ägypten	Kenia	Süd- afrika <sup>3)</sup>	Chile	Ecuador <sup>4)</sup>	Guate- mala	Kanada <sup>5)</sup>
		1976	1977	1978	1976	1970	1971	1976	1976	1977	1977
B 1	Cholera	—	—	—	—	0,0	—	—	—	—	—
B 2	Typhus (Typhus abdominalis)	0,1	0,0	—	1,1	23,2	0,1	0,7	1,0	3,6	—
B 3	Bakterielle Ruhr und Amöbeninfektion	0,0	0,1	0,0	0,1	1,2	0,3	0,1	0,5	3,9	0,0
B 4	Enteritis und sonstige Durchfallkrankheiten	1,9	0,5	1,2	7,6	41,3	92,2	20,0	105,9	211,9	0,9
B 5	Tuberkulose der Atmungsorgane	6,3	4,3	8,5	5,1	4,6	16,0	16,7	15,9	11,9	0,7
B 6	Sonstige Formen der Tuberkulose, einschl. der Spätfolgen	0,6	0,4	2,9	0,4	0,8	3,0	1,8	2,0	4,2	0,4
B 7	Pest	—	—	—	—	0,0	—	—	—	—	—
B 8	Diphtherie	0,0	0,0	—	0,8	0,1	0,3	0,4	0,2	0,2	0,0
B 9	Keuchhusten	0,0	—	—	0,0	50,6	0,9	0,7	11,8	20,1	—
B 10	Durch Streptokokken hervorgerufene Rachenkrankheiten und Scharlach	—	0,0	—	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
B 11	Meningokokkeninfektion	0,9	0,1	0,2	0,5	0,0	1,0	0,1	—	0,1	0,1
B 12	Akute Poliomyelitis	0,0	—	—	0,2	0,3	0,0	0,0	0,1	0,2	—
B 13	Pocken	—	—	—	—	8,4	—	—	—	0,0	—
B 14	Masern	0,1	0,0	—	1,5	18,7	8,2	0,6	35,7	72,2	0,0
B 15	Fleckfieber und sonstige Rickettsiosen	—	—	—	—	0,0	0,0	0,0	—	0,0	—
B 16	Malaria	0,0	—	—	0,0	6,5	0,2	—	0,4	0,1	—
B 17	Syphilis (Lues) und ihre Folgeerscheinungen	0,5	0,3	0,4	0,0	0,2	1,0	0,2	0,2	0,4	0,1
B 18	Alle sonstigen infektiösen und parasitären Krankheiten	5,8	2,7	2,9	11,1	9,4	8,6	17,1	22,2	58,0	2,1
B 19	Bösartige Neubildungen, einschl. der Neu- bildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	149,0	229,1	252,0	18,4	6,1	110,3	101,5	35,1	24,5	154,9
B 20	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbekannten Charakters	0,5	4,0	5,0	0,4	0,1	0,5	2,6	3,3	0,4	1,6
B 21	Diabetes mellitus	19,1	14,8	16,7	6,5	1,0	8,2	11,4	5,6	3,7	12,9
B 22	Avitaminosen und sonstige Ernährungs- mangelkrankheiten	0,5	0,0	0,1	1,6	8,3	4,0	12,8	17,3	33,2	0,8
B 23	Anämien	1,7	1,1	0,8	1,4	5,0	1,8	1,4	14,6	18,1	1,6
B 24	Meningitis	1,1	1,2	1,5	1,0	6,0	4,2	4,7	3,8	4,9	0,5
B 25	Akutes rheumatisches Fieber	0,1	0,0	0,0	0,9	0,1	0,3	0,2	0,5	0,1	0,1
B 26	Chronische rheumatische Herzkrankheiten	12,8	11,8	19,1	17,8	0,9	5,0	5,0	2,0	0,4	5,2
B 27	Bluthochdruck	5,9	7,0	62,3	28,2	2,0	23,0	6,5	5,0	2,2	6,5
B 28	Ischämische Herzkrankheiten	79,9	281,9	272,3	15,7	0,1	147,7	56,0	16,4	9,9	220,8
B 29	Sonstige Formen von Herzkrankheiten	84,6	17,4	45,1	81,3	2,8	33,5	29,7	38,0	26,4	20,2
B 30	Hirngefäßkrankheiten	141,6	194,7	187,8	7,5	18,6	94,9	57,9	22,8	12,0	66,7
B 31	Grippe	8,5	4,9	7,4	0,2	0,0	2,1	24,9	19,6	71,9	1,4
B 32	Pneumonie	32,1	44,8	13,2	37,3	38,7	83,2	72,1	57,5	117,1	20,9
B 33	Bronchitis, Emphysem und Asthma	29,2	53,8	46,5	62,3	9,5	29,2	11,4	60,0	18,8	11,8
B 34	Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür	5,7	6,3	10,9	1,0	0,3	4,5	3,3	3,5	1,6	2,8
B 35	Appendizitis	0,5	1,2	1,9	0,2	0,0	0,4	1,0	1,1	0,5	0,2
B 36	Darmverschluß und Eingeweidebruch	4,9	5,3	6,8	1,4	1,7	2,8	4,6	6,4	2,7	2,5
B 37	Leberzirrhose	23,5	17,8	23,0	9,4	4,1	13,1	26,7	4,8	9,6	11,9
B 38	Nephritis und Nephrose	8,6	5,8	7,9	5,6	0,6	5,5	7,7	7,4	1,2	2,5
B 39	Prostatahypertrophie <sup>6)</sup>	—	37,6	45,1	6,7	—	—	36,7	—	3,4	4,7
B 40	Fehlgeburt <sup>7)</sup>	2,1	0,7	2,4	2,3	15,0	15,6	42,0	18,5	11,2	0,3
B 41	Sonstige Komplikationen der Schwangerschaft, bei der Entbindung und im Wochenbett <sup>7)</sup>	18,5	12,8	19,6	78,5	188,1	51,6	59,3	190,4	72,8	4,7
B 42	Angeborene Mißbildungen	8,4	8,7	10,5	8,3	5,7	9,5	10,2	5,7	4,8	6,8
B 43	Geburtsverletzungen, Regelwidrigkeit der Geburt und sonstige durch Anoxie und Hypoxie hervorgerufene Zustände <sup>7)</sup>	277,2	616,8	954,4	17,3	2,2	1 190,2	949,7	239,7	246,0	312,4
B 44	Sonstige Ursachen der perinatalen Mortali- tät <sup>7)</sup>	491,7	408,5	472,8	1 238,1	618,2	1 272,4	414,0	662,7	601,7	229,8
B 45	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen	38,2	11,0	0,5	271,9	28,8	35,3	83,7	140,6	203,7	9,5
B 46	Alle sonstigen Todesursachen	102,9	115,7	161,0	420,2	45,0	74,7	68,0	63,8	50,5	75,4
BE 47	Kraftfahrzeugunfälle	17,0	18,1	19,8	2,1	1,0	45,1	9,0	19,6	16,5	22,6
BE 48	Alle sonstigen Unfälle	20,3	41,3	49,1	21,8	5,2	32,9	15,8	34,8	22,2	25,5
BE 49	Selbstmord und Selbstbeschädigung	4,1	21,3	43,1	0,1	0,2	10,8	5,7	2,7	1,9	14,2
BE 50	Alle sonstigen Gewalteinwirkungen	0,6	2,4	2,4	23,2	11,4	12,7	40,5	7,1	28,4	6,5
B 1—BE 50	<b>Insgesamt</b>	<b>834,5</b>	<b>1 153,6</b>	<b>1 311,4</b>	<b>1 173,2</b>	<b>382,3</b>	<b>978,8</b>	<b>770,3</b>	<b>830,4</b>	<b>1 115,3</b>	<b>719,5</b>

<sup>1)</sup> Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen 1968, Liste B.  
<sup>2)</sup> Ohne Angaben für Ceuta und Melilla. — Ohne Säuglinge, die innerhalb von 24 Stunden nach ihrer  
Geburt starben.

<sup>3)</sup> Ohne Bantuneger.

<sup>4)</sup> Ohne indianische Nomadenstämme.

<sup>5)</sup> Einschl. Kanadier, die in den Vereinigten Staaten — ohne Amerikaner, die in Kanada — ver-  
storben sind.

<sup>6)</sup> Je 100 000 männliche Einwohner im Alter von 50 Jahren und mehr.

<sup>7)</sup> Je 100 000 Lebendgeborene.