

13.1 Sterbefälle nach Todesursachen

je 100 000 Einwohner

Pos.- Nr. der ICD ¹⁾	Todesursache	Spanien ²⁾	Tschecho- slowakei	Ungarn	Ägypten	Kenia	Süd- afrika ³⁾	Chile	Ecuador ⁴⁾	Guate- mala	Kanada ⁵⁾
		1978	1978	1978	1977	1970	1971	1979	1977	1977	1978
B 1	Cholera	—	—	—	—	0,0	—	—	—	—	—
B 2	Typhus (Typhus abdominalis)	0,0	—	—	0,8	23,2	0,1	0,5	1,2	3,5	—
B 3	Bakterielle Ruhr und Amöbeninfektion	0,0	0,0	0,0	0,1	1,2	0,3	0,0	0,8	3,8	0,0
B 4	Enteritis und sonstige Durchfallkrankheiten	1,5	0,3	1,2	7,2	41,3	92,2	8,4	106,2	205,6	0,9
B 5	Tuberkulose der Atmungsorgane	5,0	3,9	8,5	5,2	4,6	16,0	11,8	14,7	11,5	0,6
B 6	Sonstige Formen der Tuberkulose, einschl. der Spätfolgen	0,6	0,4	2,9	0,4	0,8	3,0	1,6	1,9	4,1	0,4
B 7	Pest	—	—	—	—	0,0	—	—	—	—	—
B 8	Diphtherie	0,0	—	—	0,7	0,1	0,3	0,2	0,2	0,2	0,0
B 9	Keuchhusten	0,0	—	—	0,1	50,6	0,9	0,0	13,4	19,5	0,0
B 10	Durch Streptokokken hervorgerufene Rachenkrankheiten und Scharlach	0,0	—	—	0,0	0,1	0,0	0,0	—	0,1	0,0
B 11	Meningokokkeninfektion	1,5	0,0	0,2	0,4	0,0	1,0	—	—	—	0,2
B 12	Akute Poliomyelitis	0,0	—	—	0,3	0,3	0,0	—	0,2	0,2	0,0
B 13	Pocken	—	—	—	—	8,4	—	—	—	0,0	—
B 14	Masern	0,1	0,0	—	2,5	18,7	8,2	1,3	25,6	70,0	0,0
B 15	Fleckfieber und sonstige Rickettsiosen	—	—	—	—	0,0	0,0	—	—	0,0	—
B 16	Malaria	0,0	—	—	0,0	6,5	0,2	—	0,4	13,4	0,0
B 17	Syphilis (Lues) und ihre Folgeerscheinungen	0,4	0,2	0,4	0,1	0,2	1,0	0,1	0,2	0,3	0,1
B 18	Alle sonstigen infektiösen und parasitären Krankheiten	6,2	2,9	2,9	12,6	9,4	8,6	7,5	21,3	43,0	2,0
B 19	Bösartige Neubildungen, einschl. der Neu- bildungen der lymphatischen und blutbil- denden Organe	152,4	228,6	252,3	18,7	6,1	110,3	100,5	34,5	23,8	158,4
B 20	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbekannten Charakters	0,5	3,6	5,0	0,5	0,1	0,5	2,2	3,4	0,4	1,3
B 21	Diabetes mellitus	19,3	18,3	16,7	5,9	1,0	8,2	15,0	5,4	3,6	12,4
B 22	Avitaminosen und sonstige Ernährungs- mangelkrankheiten	0,5	0,1	0,1	2,0	8,3	4,0	8,8	17,1	32,2	0,8
B 23	Anämien	1,5	1,2	0,8	1,5	5,0	1,8	1,4	13,1	17,6	1,5
B 24	Meningitis	1,2	1,2	1,5	1,3	6,0	4,2	2,8	3,9	4,7	0,5
B 25	Akutes rheumatisches Fieber	0,1	—	0,0	1,1	0,1	0,3	0,1	0,5	0,1	0,1
B 26	Chronische rheumatische Herzkrankheiten	10,4	11,0	19,2	15,7	0,9	5,0	4,7	2,0	0,4	5,1
B 27	Bluthochdruck	4,8	7,1	62,3	25,1	2,0	23,0	3,2	5,1	2,1	6,4
B 28	Ischämische Herzkrankheiten	79,3	277,2	272,6	14,7	0,1	147,7	64,4	17,1	9,6	215,6
B 29	Sonstige Formen von Herzkrankheiten	82,6	15,5	45,2	71,9	2,8	33,5	27,3	38,0	25,6	20,2
B 30	Hirngefäßkrankheiten	134,1	195,5	188,0	8,2	18,6	94,9	64,3	23,7	11,7	64,7
B 31	Grippe	5,4	2,1	7,4	0,5	0,0	2,1	4,0	13,6	69,8	2,2
B 32	Pneumonie	27,8	42,6	13,2	43,5	38,7	83,2	46,3	49,5	113,6	19,7
B 33	Bronchitis, Emphysem und Asthma	23,4	57,3	46,5	63,4	9,5	29,2	12,1	52,0	18,3	12,5
B 34	Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür	4,5	6,7	10,9	0,9	0,3	4,5	3,0	3,5	1,5	2,7
B 35	Appendizitis	0,5	1,0	1,9	0,2	0,0	0,4	0,6	1,0	0,5	0,3
B 36	Darmverschluss und Eingeweidebruch	4,4	5,5	6,8	1,7	1,7	2,8	3,5	5,5	2,6	2,6
B 37	Leberzirrhose	22,5	18,8	23,1	9,3	4,1	13,1	33,6	5,4	9,3	12,1
B 38	Nephritis und Nephrose	6,8	8,1	7,9	4,6	0,6	5,5	8,9	7,3	1,1	2,6
B 39	Prostatahypertrophie ⁶⁾	14,0	49,0	45,1	—	—	—	35,9	—	3,4	4,1
B 40	Fehlgeburt ⁷⁾	0,8	1,8	2,4	7,1	15,0	15,6	25,1	19,7	11,2	—
B 41	Sonstige Komplikationen der Schwangerschaft, bei der Entbindung und im Wochenbett ⁷⁾	12,2	7,9	19,6	77,7	188,1	51,6	40,9	178,8	72,7	6,4
B 42	Angeborene Mißbildungen	8,0	8,8	10,5	7,6	5,7	9,5	9,6	5,2	4,7	7,0
B 43	Geburtsverletzungen, Regelwidrigkeit der Geburt und sonstige durch Anoxie und Hypoxie hervorgerufene Zustände ⁷⁾	240,8	523,1	954,4	25,6	2,2	1 190,2	919,3	272,3	245,8	270,4
B 44	Sonstige Ursachen der perinatalen Mortali- tät ⁷⁾	430,8	470,1	472,8	1 069,7	618,2	1 272,4	418,6	613,4	601,2	232,1
B 45	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen	38,3	12,1	0,5	276,6	28,8	35,3	70,7	123,6	197,7	10,1
B 46	Alle sonstigen Todesursachen	105,6	116,3	161,2	482,4	45,0	74,7	59,2	67,5	49,0	76,7
BE 47	Kraftfahrzeugunfälle	18,1	18,2	19,8	1,7	1,0	45,1	11,0	21,6	16,0	22,0
BE 48	Alle sonstigen Unfälle	21,1	42,6	49,1	18,7	5,2	32,9	14,3	33,8	0,9	25,5
BE 49	Selbstmord und Selbstbeschädigung	4,1	21,4	43,2	0,3	0,2	10,8	5,8	3,1	0,3	14,8
BE 50	Alle sonstigen Gewalteinwirkungen	0,9	2,6	2,4	26,6	11,4	12,7	41,0	7,6	49,7	6,2
B 1—BE 50	Insgesamt	807,0	1 155,5	1 312,7	1 179,5	382,3	978,8	682,6	782,8	1 082,3	716,4

1) Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen 1968, Liste B.

2) Ohne Angaben für Ceuta und Melilla.

3) Ohne Bantuneger.

4) Ohne indianische Nomadenstämme.

5) Einschl. Kanadier, die in den Vereinigten Staaten — ohne Amerikaner, die in Kanada — verstorben sind.

6) Je 100 000 männliche Einwohner im Alter von 50 Jahren und mehr.

7) Je 100 000 Lebendgeborene.