

17.7 Sterbefälle 1982

| Pos.-Nr. der ICD ¹⁾ | Todesursache | Gestorbene insgesamt | | Gestorbene männliche | | | | | | |
|--------------------------------------|---|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|------------|--------------|--------------|---------------|
| | | | | zusammen | | davon im Alter von . . . | | | | |
| | | Anzahl | je 100 000 Einwohner | Anzahl | je 100 000 Einwohner | unter 1 Jahr | 1 — 5 | 5 — 15 | 15 — 25 | 25 — 45 |
| 002.0 | Typhoides Fieber (Typhus abdominalis) | 3 | 0,0 | 1 | 0,0 | — | — | — | 1 | — |
| 004, 006 | Bakterielle Ruhr und Amöbiasis | 5 | 0,0 | 4 | 0,0 | — | — | — | — | 1 |
| 007-009 | Intestinale Infektionen durch sonstige Erreger und mangelhaft bezeichnete Infektionen des Verdauungs- systems | | | | | | | | | |
| | | 195 | 0,3 | 64 | 0,2 | 9 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 010-012 | Tuberkulose der Atmungsorgane | 1 213 | 2,0 | 918 | 3,1 | — | — | — | 4 | 56 |
| 013-018, 137 | Sonstige Formen der Tuberkulose, einschl. Spätfol- gen | 481 | 0,8 | 291 | 1,0 | — | — | 1 | 1 | 18 |
| 032 | Diphtherie | 3 | 0,0 | 1 | 0,0 | — | — | — | 1 | — |
| 033 | Pertussis (Keuchhusten) | 13 | 0,0 | 8 | 0,0 | 4 | 3 | — | — | — |
| 034 | Streptokokken-Angina und Scharlach | 5 | 0,0 | 2 | 0,0 | 1 | — | — | — | — |
| 036 | Meningokokken-Infektion | 115 | 0,2 | 69 | 0,2 | 19 | 17 | 4 | 9 | 4 |
| 045 | Akute Poliomyelitis | 5 | 0,0 | 3 | 0,0 | — | — | — | 1 | — |
| 055 | Masern | 8 | 0,0 | 4 | 0,0 | — | 3 | — | — | — |
| 084 | Malaria | 12 | 0,0 | 10 | 0,0 | — | — | — | — | 2 |
| 090-097 | Syphilis | 69 | 0,1 | 33 | 0,1 | — | — | — | — | — |
| 140-208 | Bösartige Neubildungen, einschl. des lymphatischen und hämatopoetischen Gewebes | 159 958 | 259,5 | 79 581 | 269,9 | 14 | 37 | 161 | 421 | 2 882 |
| 151 | Bösartige Neubildung des Magens | 17 288 | 28,0 | 8 855 | 30,0 | — | — | 1 | 3 | 225 |
| 153, 154 | Bösartige Neubildung des Dickdarmes und Mastdarmes | 22 474 | 36,5 | 9 756 | 33,1 | — | — | — | 6 | 256 |
| 157 | Bösartige Neubildung der Bauchspeicheldrüse | 7 379 | 12,0 | 3 472 | 11,8 | — | — | 2 | 1 | 103 |
| 162 | Bösartige Neubildung der Luftröhre, Bronchien und Lunge | 25 317 | 41,1 | 21 190 | 71,9 | — | — | — | 9 | 484 |
| 174, 175 | Bösartige Neubildung der Brustdrüse | 12 928 | 21,0 | 95 | 0,3 | — | — | — | — | 4 |
| 179-182 | Bösartige Neubildung der Gebärmutter | 4 867 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 185 | Bösartige Neubildung der Prostata | 7 887 | x | 7 887 | 26,8 | — | — | — | — | 7 |
| 240-269 | Endokrinopathien, Ernährungs- und Stoffwechselkrank- heiten | 11 996 | 19,5 | 3 964 | 13,4 | 14 | 6 | 4 | 17 | 186 |
| 250 | Diabetes mellitus | 11 270 | 18,3 | 3 781 | 12,8 | 1 | 2 | 4 | 13 | 169 |
| 280-285 | Anämien | 933 | 1,5 | 367 | 1,2 | 4 | 2 | 6 | 10 | 15 |
| 320 | Bakterielle Meningitis | 275 | 0,4 | 145 | 0,5 | 19 | 13 | 7 | 4 | 17 |
| 390-392 | Akutes rheumatisches Fieber | 28 | 0,0 | 9 | 0,0 | — | — | — | — | 1 |
| 393-398 | Chronische rheumatische Herzkrankheiten | 1 468 | 2,4 | 409 | 1,4 | — | — | 1 | 2 | 29 |
| 401-405 | Hypertonie und Hochdruckkrankheiten | 13 198 | 21,4 | 4 163 | 14,1 | — | 2 | 4 | 2 | 93 |
| 410 | Akuter Myokardinfarkt | 82 771 | 134,3 | 49 705 | 168,6 | — | — | — | 21 | 1 318 |
| 430-438 | Krankheiten des zerebrovaskulären Systems | 99 579 | 161,6 | 38 032 | 129,0 | 2 | 1 | 14 | 51 | 548 |
| 480-486 | Pneumonie | 15 627 | 25,4 | 6 846 | 23,2 | 48 | 26 | 8 | 31 | 134 |
| 487 | Grippe | 387 | 0,6 | 142 | 0,5 | 1 | 1 | — | 1 | 5 |
| 490, 491 | Nicht näher bezeichnete und chronische Bronchitis | 13 019 | 21,1 | 9 355 | 31,7 | 3 | 4 | 1 | 6 | 38 |
| 492, 493 | Emphysem und Asthma | 8 965 | 14,5 | 5 490 | 18,6 | — | 2 | 11 | 62 | 133 |
| 531-533 | Magengeschwür und ulcus duodeni | 3 772 | 6,1 | 2 028 | 6,9 | — | — | — | 3 | 91 |
| 540-543 | Appendizitis | 463 | 0,8 | 231 | 0,8 | — | 1 | 5 | 2 | 13 |
| 550-553, 560 | Eingeweidebrüche und Darmverschluss ohne Angabe eines Eingeweidebruches | 3 165 | 5,1 | 1 166 | 4,0 | 8 | 1 | 1 | 8 | 25 |
| 571 | Chronische Leberkrankheit und -zirrhose | 15 507 | 25,2 | 10 134 | 34,4 | 1 | 2 | 3 | 15 | 1 435 |
| 600 | Prostatahyperplasie | 1 113 | x | 1 113 | 14,3 ³⁾ | — | — | — | — | — |
| 630-639 | Schwangerschaft mit nachfolgender Fehlgeburt | 12 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 640-676 | Sonstige Komplikationen der Schwangerschaft, bei Ent- bindung und im Wochenbett | 98 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 740-759 | Kongenitale Anomalien | 2 608 | 4,2 | 1 358 | 4,6 | 951 | 118 | 69 | 65 | 80 |
| 760-779 | Bestimmte Affektionen, die ihren Ursprung in der Perina- talzeit haben | 2 877 | 4,7 | 1 679 | 5,7 | 1 669 | 7 | 1 | 1 | 1 |
| 780-799 | Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen | 17 207 | 27,9 | 7 902 | 26,8 | 578 | 50 | 25 | 180 | 934 |
| Rest aus 001-799 | Alle sonstigen Todesursachen | 216 645 | 351,5 | 93 758 | 318,0 | 259 | 164 | 199 | 556 | 3 465 |
| E 810- E 825 | Kraftfahrzeugunfälle | 11 034 | 17,9 | 7 888 | 26,8 | 7 | 100 | 313 | 3 095 | 1 919 |
| E 950- E 959 | Selbstmord und Selbstbeschädigung | 13 148 | 21,3 | 8 787 | 29,8 | — | — | 66 | 1 109 | 2 981 |
| E 960- E 999 | Alle sonstigen Gewalteinwirkungen | 2 200 | 3,6 | 1 323 | 4,5 | 17 | 11 | 36 | 213 | 472 |
| 001-999 | Insgesamt | 715 857²⁾ | 1 161,4 | 344 275²⁾ | 1 167,7 | 3 847 | 772 | 1 146 | 6 410 | 18 229 |

*) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und gerichtliche Todes-
erklärungen.1) Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen 1979,
9. Revision.