13 Gesundheitswesen

13.1 Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen

je 100 000 Einwohner

PosNr. der ICD1)	Todesursache	Bundes- republik Deutschland	Bulgarien 1983	Frankreich²)	Griechenland	Luxemburg	Niederlande 1983	Österreich 1983
010-012	Tuberkulose der Atmungsorgane	1,5	3,5	2,5	2,5	0.5	0.2	3.0
013-018, 137 140-208	Tuberkulose sonstiger Organe, einschl. Spätfolgen Bösartige Neubildungen, einschl. des lymphatischen	2,2	0,3	0,5	0,3	_	0,1	0,7
	und hämatopoetischen Gewebes	258,9	157,2	234,7	174,0	261,1	223,5	249,3
153	Bösartige Neubildung des Dickdarmes	25,6	6,1	18,6	8,0	22,4	19,5	22.5
154 162	Bösartige Neubildung des Mastdarmes	11,8	10,2	8,7	1,3	8,5	7,1	13,1
	Lunge	41,8	32,5	32,8	39,0	58,2	55,0	41,9
174	Bösartige Neubildung der weiblichen Brustdrüse	40,9	20,4	32,4	23,5	45,7	39,9	36,8
185	Bösartige Neubildung der Prostata	27,8	11,8	26,9	13,4	25,3	23,8	25,1
250	Diabetes mellitus	18,0	14,7	13,5	33,3	23,5	9,4	16,1
390-459	Krankheiten des Kreislaufsystems	574,8	662,3	374,8	398,8	554,9	364,8	663,0
401-405	Hypertonie und Hochdruckkrankheiten	17,9	24,7	9,9	17,3	15,0	5,1	28,3
410	Akuter Myokardinfarkt	131,6	77,8	72,9	76,7	92,1	138,3	137,0
411-414 415-429	Sonstige ischämische Herzkrankheiten Krankheiten des Lungenkreislaufs und sonstige Formen	90,0	125,4	22,2	13,6	87,5	33,0	76,5
	von Herzkrankheiten	143,4	92,1	110,8	111,3	133,7	85,3	173,5
430-438	Krankheiten des zerebrovaskulären Systems	151,9	246,4	124,1	167,3	188,1	82,0	197,8
480-486 490-493	Pneumonie	26,8	51,2	11,8	14.5	20,8	20,9	21.7
	Emphysem und Asthma	35,9	28,0	13,4	17,1	27,6	19,2	34,7
571 630-676	Chronische Leberkrankheit und -zirrhose Komplikationen während der Schwangerschaft, Ent-	23,6	13,9	27,6	11,4	25,7	5,3	30,2
760-779	bindung und im Wochenbett ³)Bestimmte Affektionen, die ihren Ursprung in der	10,8	22,0	15,5	11.7		5,3	11,1
	Perinatalzeit haben³)⁴)	405,4	538,2	251,6	806,4	310.1	325,4	538.2
E 810-E 819	Kraftfahrzeugunfälle im Verkehr	15,8	11,1	20,4	19.7	19.4	11.8	25,9
E 950-E 959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	20,5	13,4	19,6	3,5	18,9	12,0	27,0

PosNr. der ICD¹)	Todesursache	Rumänien 1983	Ungarn 1984	Vereinigte Staaten	Israel 1983	Japan 1984	Australien /	Neuseeland 1983
010-012	Tuberkulose der Atmungsorgane	3,5	6,3	0,6	0.7	3.9	0,4	0.3
013-018, 137 140-208	Tuberkulose sonstiger Organe, einschl. Spätfolgen Bösartige Neubildungen, einschl. des lymphatischen	0,3	0,6	0,1	0,2	0,2	-0,1	0,1
	und hämatopoetischen Gewebes	128,1	267,4	187,4	126,5	152,5	166,4	184,1
153	Bösartige Neubildung des Dickdarmes	5,1	19,8	19,6	12,9	8,8	18,1	20,3
154 162	Bösartige Neubildung des Mastdarmes	4,6	15,7	3,7	4,1	6,5	6,4	9,9
	Lunge	22,8	55,0	48,1	16,9	22,9	35,1	38,4
174	Bösartige Neubildung der weiblichen Brustdrüse	17,3	33,4	31,4	28,4	7,9	26,4	33,1
185	Bösartige Neubildung der Prostata	9,0	23,6	21,4	10,6	3,9	18,2	20,3
250	Diabetes mellitus	6,3	19,7	14,9	10,9	7,9	11,0	11,4
390-459	Krankheiten des Kreislaufsystems	603,4	737.3	420,0	293,5	248,8	355,4	382.8
401-405	Hypertonie und Hochdruckkrankheiten	82,0	47,9	13,6	11,2	10,9	7.2	8,2
410	Akuter Myokardinfarkt	44,6	137,3	125,7	99.7	25,3	145,4	135.9
411-414 415-429	Sonstige ischämische Herzkrankheiten Krankheiten des Lungenkreislaufs und sonstige Formen	100,2	119,3	113,1	45,1	15,9	58,7	85,7
	von Herzkrankheiten	144,7	61,6	74,3	53.2	71,3	37,1	36,1
430-438	Krankheiten des zerebrovaskulären Systems	148,6	219,6	68,1	75,8	117,2	82,3	91.1
480-486 490-493	Pneumonie	46,3	10,0	20,8	17,4	.32,5	10,9	39,5
	Emphysem und Asthma	44,9	51,1	8,4	4,7	11.3	13.6	23,0
571 630-676	Chronische Leberkrankheit und -zirrhose Komplikationen während der Schwangerschaft, Ent-	32,3	43,1	12,0	5,3	14,2	7,6	3,8
760-779	bindung und im Wochenbett ³) Bestimmte Affektionen, die ihren Ursprung in der	170,1	15,2	7,9	2.0	15,3	3,7	19,8
	Perinatalzeit haben³)⁴)	563,3	1 188,6	562,0	576,4	257,3	375.1	326.9
E 810-E 819	Kraftfahrzeugunfälle im Verkehr		15,3	19,3	10,8	10.2	18.4	19,4
E 950-E 959	Selbstmord und Selbstbeschädigung		45,9	12,2	6.1	20,4	11.2	10.9

¹⁾ Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen 1979, 9. Revi-

sion.
2) Ohne Säuglinge, die vor ihrer Registrierung starben.

³⁾ Je 100 000 Lebendgeborene. 4) Nur Gestorbene bis unter 1 Jahr.