

33. Technisch-wirtschaftliche Kennziffern 1955 bis 1957; vierteljährlich 1957

Bereich des Ministeriums Bereich der Hauptverwaltung Bezeichnung der Kennziffer	Einheit	Technisch-wirtschaftliche Kennziffern						
		1955	1956	1957	Quartale 1957			
					I	II	III	IV
Kohle und Energie								
Elektroenergie								
Spezifischer Wärmeverbrauch	kcal/kWh	5173	4907	4718	4683	4732	4780	4676
Spezifischer Brennstoffverbrauch (bezogen auf Normalheizwert 7000 kcal)	kg/kWh	0,739	0,701	0,674	0,669	0,676	0,683	0,668
Thermischer Wirkungsgrad	Prozent	16,6	17,5	18,2	18,4	18,2	18,0	18,2
Zeitliche Ausnutzung der Anlagen	Prozent	63,9	67,2	67,9	71,3	65,5	66,4	72,9
Bedienungsfaktor — Anzahl der Produktionsarbeiter je 1 MW installierte Kraftwerksleistung	Pers./MW	4,50	4,57	4,22	4,36	4,26	4,16	4,09
Steinkohle								
Abbaufortschritt im Streb je Monat	m	18,3	15,0	14,1	14,0	13,7	14,3	14,3
Vortrieb in Querschlägen und Richtstrecken je Monat	m	38,8	40,1	38,3	38,7	38,4	39,7	36,6
Braunkohle								
Ausnutzungskoeffizient der								
Abraumbagger	Prozent	46,7	43,5	46,1	40,9	50,2	47,7	45,4
Abraumabsetzer	Prozent	39,5	36,9	40,2	32,2	46,0	43,3	41,0
Grubenbagger	Prozent	39,9	37,9	38,1	38,4	38,4	37,7	37,4
Brikettfabriken								
Zeitliche Ausnutzung der Trocknungsanlagen	Prozent	.	92,8	94,2	95,1	94,4	94,4	92,9
Spezifische Heizflächenleistung der Trocknungsanlagen je qcm Heizfläche und Stunde	kg	.	5,74	5,82	5,77	5,86	5,84	5,79
Zeitliche Ausnutzung der Pressen	qcm/Std.	.	88,4	90,0	90,2	90,3	90,4	89,0
Brikettleistung je qcm installierter Maulquerschnitt und Stunde	kg	.	23,50	26,64	26,71	26,84	26,54	26,47
	qcm/Std.							
Berg- und Hüttenwesen								
Ausbringen von Elektrolyt- und Raffinadekupfer aus Kupfererz	Prozent	79,7	79,8	78,9	80,6	79,1	77,9	78,0
Koksverbrauch je Tonne verhüttetes Kupfererz	kg	240	262	260	264	258	255	262
Nutzungskoeffizient (Benötigter Nutzraum je t Roheisen u. Kalendertag) der								
Hochöfen	cbm	1,45	1,44	1,29	1,26	1,29	1,31	1,30
Niederschachtsöfen	cbm	.	1,04	0,89	0,96	0,87	0,87	0,87
Koksverbrauch je t Roheisen	t	1,54	1,53	1,49	1,44	1,46	1,52	1,52
Stahlerzeugung je qm Herdfläche der Siemens-Martin-Öfen und je Kalendertag, bezogen auf Rohstahl flüssig	t	4,53	4,82	4,86	4,78	4,87	4,91	4,90
Verbrauch je t Kalziumkarbid (Basis 3001 C ₂ H ₂)								
Schwarzmaterial	t eff.	0,787	0,775	0,769	0,782	0,757	0,775	0,762
Gebrannter Industriealkali ¹⁾	t eff.	1,091	1,068	1,102	1,090	1,121	1,092	1,103
Verbrauch von kalzinierter Soda je t Ätznatron aus Soda	t Na ₂ CO ₃	1,496	1,461	1,398	1,399	1,387	1,382	1,421
Verbrauch von Kaprolaktam je t Perlonseide ²⁾	t	1,161	1,147	1,112	1,106	1,110	1,127	1,109
Leichtindustrie								
Schnittholz, Furniere, Platten								
Ausbeute je fm Rohholz								
Nadelschnittholz	Prozent	74,9	75,3	74,8	74,9	75,5	73,9	75,2
Laubschnittholz								
Rotbuche	Prozent	80,9	81,0	81,4	80,9	80,6	82,7	82,0
Eiche	Prozent	73,8	73,0	73,5	73,3	73,2	71,3	75,7
Sonstiges Laubschnittholz	Prozent	75,0	72,5	73,2	73,2	73,4	72,8	73,3
Schälfurniere	Prozent	65,3	64,6	65,5	63,9	65,2	66,5	66,4
Messfurniere	Prozent	73,8	72,1	71,7	69,9	72,6	72,0	72,5
Baumwolle und Deko								
Spinnverluste, Drei- und Vierzylinder-Garne								
Baumwolle, gekämmt	Prozent	27,8	28,5	27,2	.	.	.	.
Baumwolle, kardierte	Prozent	7,0	8,0	8,9	.	.	.	.
Zellwolle, baumwollartig	Prozent	2,4	2,3	1,9	.	.	.	.
Garneinsatzgewichte								
Vigognegewebe	g/qm	407	391	378	.	.	.	.
Möbelstoffe	g/qm	586	570	566	.	.	.	.
Tüll und Gardinen	g/qm	73,3	73,2	69,4	.	.	.	.
Anteil der I. Wahl und Sonderklasse bei								
Kammgarngewebe	Prozent	91,7	90,5	90,2	89,9	89,6	90,0	91,5
Baumwollgewebe	Prozent	92,9	93,0	91,1	92,9	92,1	89,6	89,4
Kunstseidengewebe	Prozent	87,0	82,3	86,3	83,7	88,1	87,3	85,4
Untertrikotagen	Prozent	.	96,2	95,8	96,0	96,0	95,5	95,6
Obertrikotagen	Prozent	.	97,7	97,6	98,1	97,7	97,5	97,3
Taschner- und Galanteriewaren	Prozent	98,5	98,8	98,4	98,7	98,5	98,2	98,4
Lederbekleidung	Prozent	97,1	98,9	98,9	99,1	98,0	99,2	99,2
Handschuhen	Prozent	92,9	94,0	94,6	95,0	95,0	94,0	94,2
Lebensmittelindustrie								
Fleisch und Fette								
Ausbeute je t Lebendgewicht								
Fleisch								
Schwein	Prozent	.	67,2	67,1	67,7	67,8	66,4	66,8
Rind, Kalb, Schaf, Ziege	Prozent	.	61,6	60,4	59,7	59,9	61,3	60,8
Tierische Fette, roh								
Schwein	Prozent	.	13,5	14,8	14,3	14,2	15,5	14,9
Fischwirtschaft								
Fangleistung je Einsatztag der								
Logger	t	1,48	1,77	2,16	2,51	2,33	2,41	1,03
Trawler	t	6,82	6,57	6,03	3,94	8,62	6,99	4,28

¹⁾ CaO-Gehalt 1955 und 1956: 94 Prozent; 1957: 92 Prozent. — ²⁾ 1956 einschließlich Perlon-Cordseide.