

3. Neugemeldete Erkrankungen an Syphilis und Gonorrhoe 1948 bis 1960; nach Bezirken 1960

Jahr — Bezirk	Syphilis		Gonorrhoe		Syphilis		Gonorrhoe	
	Insgesamt	darunter an- steckungs- fähig ¹⁾	Insgesamt	darunter an- steckungs- fähig ²⁾	Insgesamt	darunter an- steckungs- fähig	Insgesamt	darunter an- steckungs- fähig
1948	24 811	15 403	35 224	27 510	13,0	8,1	18,5	14,4
1949	16 168	7 304	31 258	24 004	8,6	3,9	16,5	12,7
1950	12 333	4 164	27 945	23 669	6,7	2,3	15,2	12,9
1951	9 066	2 306	30 131	29 639	4,9	1,3	16,4	16,2
1952	7 980	1 841	38 939	38 274	4,4	1,0	21,2	20,9
1953	6 786	1 510	43 830	43 316	3,7	0,8	24,1	23,8
1954	6 004	1 180	40 014	39 500	3,3	0,7	22,2	21,9
1955	5 192	769	36 690	36 012	2,9	0,4	20,4	20,1
1956	4 233	501	33 608	33 069	2,4	0,3	19,0	18,7
1957	3 435	398	32 075	31 656	2,0	0,2	18,3	18,1
1958	3 180	282	28 167	27 820	1,8	0,2	16,2	16,0
1959	2 675	332	26 973	26 624	1,5	0,2	15,6	15,4
1960	2 183	192	25 736	25 464	1,3	0,1	14,9	14,8

Nach Bezirken 1960

	Insgesamt	darunter an- steckungs- fähig ¹⁾	Insgesamt	darunter an- steckungs- fähig ²⁾	Insgesamt	darunter an- steckungs- fähig	Insgesamt	darunter an- steckungs- fähig
Rostock	94	8	1 683	1 666	1,13	0,10	20,22	20,01
Schwerin	80	3	693	685	1,28	0,05	11,07	10,95
Neubrandenburg	66	4	680	670	1,01	0,06	10,38	10,22
Potsdam	108	12	1 460	1 451	0,92	0,10	12,50	12,42
Frankfurt	60	5	827	822	0,91	0,08	12,55	12,47
Cottbus	51	4	1 249	1 242	0,63	0,05	15,45	15,37
Magdeburg	228	37	1 741	1 705	1,65	0,27	12,59	12,33
Halle	330	15	2 963	2 937	1,67	0,08	15,00	14,87
Erfurt	170	5	1 470	1 463	1,36	0,04	11,73	11,68
Gera	68	7	1 193	1 181	0,93	0,10	16,38	16,21
Suhl	60	1	514	509	1,10	0,02	9,42	9,33
Dresden	243	21	2 561	2 536	1,29	0,11	13,55	13,42
Leipzig	223	12	2 647	2 584	1,46	0,08	17,38	16,96
Karl-Marx-Stadt	257	14	3 094	3 057	1,21	0,07	14,62	14,44
Hauptstadt Berlin	145	44	2 961	2 956	1,35	0,41	27,49	27,45

¹⁾ Syphilis connata Frühform A5a, Syphilis I florida, Syphilis II florida, Syphilis II florida recidiva — ohne per acta-Fälle. —
²⁾ G1a akute Gonorrhoe, G1b chron. Gonorrhoe des Urogenitalsystems, G1d Gonokokkeninfektion der Augen — unbehandelt.

4. Neugemeldete Erkrankungen an Syphilis und Gonorrhoe nach Altersgruppen und Geschlecht 1959 und 1960

Altersgruppe	Neugemeldete Erkrankungen											
	Syphilis						Gonorrhoe					
	1959			1960			1959			1960		
	Insgesamt	männlich	weiblich	Insgesamt	männlich	weiblich	Insgesamt	männlich	weiblich	Insgesamt	männlich	weiblich
unter 5 Jahre	31	10	21	46	20	26	50	5	45	50	7	43
5 bis 15	41	18	23	32	13	19	71	8	63	58	2	56
15 bis 18	64	20	44	51	18	33	1 724	596	1 128	1 460	413	1 047
18 bis 25	366	159	207	213	111	102	15 286	8 205	7 081	14 827	8 052	6 775
25 bis 30	191	89	102	114	41	73	5 651	3 026	2 625	5 382	2 887	2 495
30 bis 40	389	139	250	268	96	172	3 016	1 525	1 491	2 956	1 540	1 416
40 bis 50	399	139	260	336	123	213	791	396	395	660	348	312
50 Jahre und darüber	1 194	456	738	1 123	488	635	384	264	120	343	232	111
Zusammen	2 675	1 030	1 645	2 183	910	1 273	26 973	14 025	12 948	25 736	13 481	12 255
Je 10 000 der Bevölkerung ¹⁾												
unter 5 Jahre	0,23	0,15	0,32	0,34	0,29	0,40	0,38	0,07	0,70	0,37	0,10	0,66
5 bis 15	0,18	0,16	0,21	0,14	0,11	0,17	0,32	0,07	0,57	0,25	0,02	0,50
15 bis 18	0,84	0,52	1,18	0,75	0,52	0,98	22,64	15,39	30,14	21,43	11,95	31,18
18 bis 25	1,84	1,58	2,11	1,08	1,11	1,05	76,84	81,46	72,09	75,27	80,76	69,64
25 bis 30	1,77	1,69	1,85	1,02	0,74	1,30	52,38	57,30	47,66	48,10	51,79	44,45
30 bis 40	1,97	1,74	2,12	1,35	1,17	1,48	15,24	19,08	12,63	14,89	18,74	12,17
40 bis 50	2,14	1,93	2,27	1,88	1,79	1,93	4,24	5,50	3,44	3,69	5,08	2,83
50 Jahre und darüber	1,97	1,82	2,08	1,85	1,96	1,78	0,64	1,05	0,34	0,57	0,93	0,31
Zusammen	1,55	1,33	1,73	1,27	1,17	1,34	15,59	18,04	13,59	14,93	17,37	12,93

¹⁾ Gleicher Altersgruppe bzw. gleichen Geschlechts.