

3. Neugemeldete Erkrankungen an Syphilis und Gonorrhoe 1949 bis 1961; nach Bezirken 1961

Jahr — Bezirk	Syphilis		Gonorrhoe		Syphilis		Gonorrhoe	
	Insgesamt ¹⁾	darunter an- steckungs- fähig ²⁾	Insgesamt ¹⁾	darunter an- steckungs- fähig ²⁾	Insgesamt	darunter an- steckungs- fähig	Insgesamt	darunter an- steckungs- fähig
	Je 10 000 der Bevölkerung							
1949	16 168	7 304	31 258	24 004	8,6	3,9	16,5	12,7
1950	12 333	4 164	27 945	23 669	6,7	2,3	15,2	12,9
1951	9 066	2 306	30 131	29 639	4,9	1,3	16,4	16,2
1952	7 980	1 841	38 939	38 274	4,4	1,0	21,2	20,9
1953	6 786	1 510	43 830	43 316	3,7	0,8	24,1	23,8
1954	6 004	1 180	40 014	39 500	3,3	0,7	22,2	21,9
1955	5 192	769	36 690	36 012	2,9	0,4	20,4	20,1
1956	4 233	501	33 608	33 069	2,4	0,3	19,0	18,7
1957	3 435	398	32 075	31 656	2,0	0,2	18,3	18,1
1958	3 180	282	28 167	27 820	1,8	0,2	16,2	16,0
1959	2 675	332	26 973	26 624	1,5	0,2	15,6	15,4
1960	2 183	192	25 736	25 464	1,3	0,1	14,9	14,8
1961	441	175	24 893	24 855	0,3	0,1	14,5	14,5

Nach Bezirken 1961

Rostock	20	2	1 672	1 671	0,24	0,02	20,1	20,1
Schwerin	3	1	739	738	0,05	0,02	11,9	11,9
Neubrandenburg	1	—	547	545	0,02	—	8,5	8,4
Potsdam	39	16	1 222	1 217	0,34	0,14	10,6	10,6
Frankfurt	18	5	783	781	0,27	0,08	11,9	11,9
Cottbus	3	—	1 122	1 122	0,04	—	13,9	13,9
Magdeburg	71	40	1 788	1 786	0,52	0,29	13,0	13,0
Halle	20	4	2 931	2 928	0,10	0,02	14,9	14,9
Erfurt	28	14	1 448	1 447	0,23	0,11	11,6	11,6
Gera	41	2	895	895	0,57	0,03	12,3	12,3
Suhl	2	—	444	443	0,04	—	8,2	8,1
Dresden	24	11	2 547	2 541	0,13	0,06	13,5	13,5
Leipzig	55	36	2 783	2 774	0,36	0,24	18,4	18,3
Karl-Marx-Stadt	12	7	3 136	3 131	0,06	0,03	14,9	14,9
Hauptstadt Berlin	104	37	2 836	2 836	0,98	0,35	26,7	26,7

¹⁾ Ab 1. Januar 1961 werden nur die Diagnosen der Fröhysyphilis und der Connata-Fröhform sowie der unbehandelten Gonokokkeninfektion erfaßt. — ²⁾ Syphilis connata Fröhform A5a, Syphilis I florida, Syphilis II florida, Syphilis II florida recidiva — ohne per acta-Fälle. — ³⁾ G1a akute Gonorrhoe, G1b chron. Gonorrhoe des Urogenitalsystems, G1d Gonokokkeninfektion der Augen — unbehandelt.

4. Neugemeldete Erkrankungen an Syphilis und Gonorrhoe nach Altersgruppen und Geschlecht 1960 und 1961

Altersgruppe	Neugemeldete Erkrankungen											
	Syphilis						Gonorrhoe					
	1960			1961 ¹⁾			1960			1961 ¹⁾		
	Insgesamt	männlich	weiblich	Insgesamt	männlich	weiblich	Insgesamt	männlich	weiblich	Insgesamt	männlich	weiblich
unter 5 Jahre ..	46	20	26	25	13	12	50	7	43	41	10	31
5 bis .. 15	32	13	19	5	2	3	58	2	56	59	2	57
15 18	51	18	33	25	11	14	1 460	413	1 047	1 621	429	1 192
18 25	213	111	102	156	76	80	14 827	8 052	6 775	14 250	7 998	6 252
25 30	114	41	73	75	46	29	5 382	2 887	2 495	5 200	2 854	2 346
30 40	268	96	172	60	30	30	2 956	1 540	1 416	2 803	1 514	1 289
40 50	336	123	213	40	23	17	660	348	312	621	301	320
50 Jahre und darüber ..	1 123	488	635	55	30	25	343	232	111	298	196	102
Zusammen	2 183	910	1 273	441	231	210	25 736	13 481	12 255	24 893	13 304	11 589
	Je 10 000 der Bevölkerung ²⁾											
unter 5 Jahre ..	0,34	0,29	0,40	0,19	0,19	0,18	0,37	0,10	0,66	0,30	0,14	0,47
5 bis .. 15	0,14	0,11	0,17	0,02	0,02	0,03	0,25	0,02	0,50	0,25	0,02	0,49
15 18	0,75	0,52	0,98	0,43	0,37	0,49	21,43	11,95	31,18	27,80	14,54	41,38
18 25	1,08	1,11	1,05	0,82	0,79	0,85	75,27	80,76	69,64	74,99	83,25	66,55
25 30	1,02	0,74	1,30	0,65	0,79	0,50	48,10	51,79	44,45	44,87	48,87	40,81
30 40	1,35	1,17	1,48	0,31	0,36	0,27	14,89	18,74	12,17	14,33	18,23	11,45
40 50	1,88	1,79	1,93	0,23	0,35	0,16	3,69	5,08	2,83	3,56	4,53	2,97
50 Jahre und darüber ..	1,85	1,96	1,78	0,09	0,12	0,07	0,57	0,93	0,31	0,49	0,79	0,29
Zusammen	1,27	1,17	1,34	0,26	0,30	0,22	14,93	17,37	12,93	14,54	17,23	12,32

¹⁾ Ab 1. Januar 1961 werden nur die Diagnosen der Fröhysyphilis und der Connata-Fröhform sowie der unbehandelten Gonokokkeninfektion erfaßt. — ²⁾ Gleicher Altersgruppe bzw. gleichen Geschlechts.