

XXII. Erkrankungen und Todesursachen

I. Erkrankungen an den wichtigsten übertragbaren Krankheiten, für die eine Meldepflicht besteht

Jahr	Typhus und Paratyphus	Ruhr	Diphtherie	Scharlach	Polio-myelitis	Aktive Tuberkulose		Lebensmittelvergiftung		Meningitis epidemica	Virusmeningitis und Virusencephalitis ^{1) 2)}	Hepatitis infectiosa	Bißverletzung	Sonstige Kontakte
						Insgesamt	darunter aktive Tbk der Atmungsorgane	Salmonellen ¹⁾	Botulismus					
1950	5 462	1 727	19 283	74 768	452	92 760	80 113	5 786	396	124
1951	4 588	2 233	15 956	82 921	669	79 841	69 332	6 276	319	82	789	.	.	445
1952	3 272	642	12 473	55 078	507	67 394	59 122	5 980	238	54	3 218	.	.	528
1953	4 001	918	9 831	25 983	2 652	60 236	52 451	2 119	52	371	6 099	.	.	1 602
1954	3 808	1 252	10 530	39 142	1 141	52 041	45 350	1 657	49	357	8 362	.	.	1 664
1955	2 925	4 287	8 224	37 968	968	47 015	40 948	2 127	36	326	49	17 427	.	1 636
1956	2 554	2 912	6 369	23 244	675	41 383	36 162	1 289	29	291	60	28 954	.	3 412
1957	2 140	7 688	5 564	14 145	1 601	34 554	29 748	740	33	276	1 466	37 017	.	9 738
1958	1 541	2 366	4 258	15 764	958	29 750	25 719	616	13	252	546	34 269	.	6 912
1959	1 785	16 686	4 401	15 861	960	26 101	22 742	6 071	17	225	344	42 514	.	5 975
1960	1 063	7 642	3 786	15 170	131	23 418	20 361	5 171	19	192	321	45 424	.	7 931
1961	1 150	10 845	3 176	15 472	3	20 367	17 440	7 520	25	165	421	46 844	.	7 115
1962	755	18 008	1 473	12 608	3	20 536	17 564	7 907	34	161	288	26 136	.	6 912
1963	918	9 139	771	15 964	—	19 566	16 781	10 549	21	175	1 096	27 594	.	5 927
1964	778	23 712	200	18 723	—	18 931	16 340	8 924	14	130	1 003	35 305	.	6 524
1965	512	9 574	107	22 403	—	15 933	13 444	9 006	32	102	520	43 264	.	7 147
1966	492	12 251	45	32 050	—	13 777	11 540	7 083	11	96	1 580	39 413	.	7 252
1967	482	9 825	19	27 357	—	12 868	10 569	6 541	5	74	3 192	30 292	.	5 850
1968	410	7 086	16	26 479	—	11 725	9 693	5 735	7	68	2 238	23 407	2 135	5 656
1969	358	8 509	13	24 164	—	10 695	8 791	5 726	11	60	2 358	18 627	2 484	4 875
1970	318	5 149	6	27 272	—	5 494	8	69	3 023	18 633	2 247	3 642

Je 10 000 der Bevölkerung

1950	3,0	0,9	10,5	40,7	0,2	50,4	43,6	3,1	0,2	0,06
1951	2,5	1,2	8,7	45,2	0,4	43,2	37,8	3,4	0,2	0,04	0,4	.	.	0,2
1952	1,8	0,4	6,8	30,1	0,3	36,8	32,3	3,3	0,1	0,02	1,8	.	.	0,3
1953	2,2	0,5	5,4	14,3	1,5	33,4	29,0	1,2	0,03	0,2	0,03	3,4	.	0,9
1954	2,1	0,7	5,8	21,7	0,6	23,8	25,1	0,9	0,03	0,2	0,05	4,6	.	0,9
1955	1,6	2,4	4,6	21,2	0,5	26,2	22,8	1,2	0,02	0,2	0,03	9,7	.	0,9
1956	1,4	1,6	3,6	13,1	0,4	23,4	20,4	0,7	0,02	0,2	0,03	16,3	.	1,9
1957	1,2	4,4	3,2	8,1	0,9	19,7	17,0	0,4	0,02	0,2	0,84	21,1	.	5,5
1958	0,9	1,4	2,5	9,1	0,6	17,1	14,8	0,4	0,01	0,1	0,31	19,7	.	4,0
1959	1,0	9,6	2,5	9,2	0,6	15,1	13,1	3,5	0,01	0,1	0,20	24,6	.	3,5
1960	0,6	4,4	2,2	8,8	0,08	13,6	11,8	3,0	0,01	0,1	0,19	26,3	.	4,6
1961	0,7	6,3	1,9	9,0	0,002	11,9	10,2	4,4	0,01	0,1	0,25	27,4	.	4,2
1962	0,4	10,5	0,9	7,4	0,002	12,0	10,3	4,6	0,02	0,1	0,17	15,3	.	4,0
1963	0,5	5,3	0,4	9,3	—	11,4	9,8	6,1	0,01	0,1	0,64	16,1	.	3,5
1964	0,5	16,9	0,1	11,0	—	11,1	9,6	5,3	0,01	0,1	0,59	20,8	.	3,8
1965	0,3	5,6	0,1	13,2	—	9,4	7,9	5,3	0,02	0,1	0,31	25,4	.	4,2
1966	0,3	7,2	0,0	18,8	—	8,1	6,8	4,2	0,01	0,1	0,93	23,1	.	4,3
1967	0,3	5,6	0,0	16,0	—	7,5	6,2	3,8	0,00	0,0	1,87	17,7	.	3,4
1968	0,2	4,1	0,0	15,5	—	6,9	5,7	3,4	0,00	0,0	1,31	13,7	1,2	3,3
1969	0,2	5,0	0,0	14,2	—	6,3	5,1	3,4	0,01	0,0	1,38	10,9	1,5	2,9
1970	0,2	3,0	0,0	16,0	—	3,2	0,00	0,0	1,77	10,9	1,3	2,1

¹⁾ Ergebnisse für 1957 laut Veröffentlichung des Ministeriums für Gesundheitswesen in der Zeitschrift „Das Deutsche Gesundheitswesen“. — ²⁾ 1950 nur Virusencephalitis.